

Probabilidad de Mejoría con quimioterapia
en un cáncer metastásico

1

Et al Soriano Garcia J.
Soriano Lorenzo J.
Lima Perez M. 2020

Quimioterapia Metronámico en pacientes
con cáncer de mama metastásico 7

“La administración de quimioterapia citotóxica a dosis máximas tolerables tiene un beneficio modesto en prolongación de supervivencia y atrae consigo un aumento significativo de las toxicidades, lo cual deteriora la calidad de vida de las pacientes.”

Probabilidad de Mejoría con quimioterapia
en un cancer metastásico

2

Et al Reyes sebastian J.
Gonzales Konstanza B.
Navarrete Muñoz Camila
Salazar Andrea P. 2020

Actualización general de inmunoterapia
en cancer 7

"Las células cancerígenas suprimen la respuesta inmunológica hacia ellas mediante activación de vías reguladoras negativas" por ello las mismas células de nuestro organismo no pueden combatir contra esta enfermedad y por ende avanza.

Probabilidad de Mejoría con quimioterapias
en un cáncer metastásico

3

Et al Bouillon Mauricio T.

Sobrevilla Moreno Nova 2022

Imunoterapia de mantenimiento en
un cáncer Urogenital avanzado

11

Se dice que puede existir una mayor mejoría utilizando
la inmunoterapia como una estrategia de tratamiento
en aquellos pacientes con cáncer urogenital metastásico,
ya que puede ser mejor que las quimioterapias.

Probabilidad de Mejoría con quimioterapia
en un cáncer metastásico

4

Et al Valeria Arsentales Montalva
Maria Tenorio Guadalupe
Yessabell Yonz Buendia 2018

Quimioterapia y alternativas en el cáncer
terminal: Desafío pendiente para el Perú

El cáncer terminal no tiene cura y es resistente a lo que nos lleva tener un pronóstico de vida menor a 6 meses, la quimioterapia puede tener un rol limitado en pacientes con cáncer terminal al encontrar que los pacientes con una puntuación en el puntaje ECOG mayor o igual a 3 presentaron tasas bajas de respuesta.

Probabilidad de mejoría con quimioterapia
en un cáncer metastásico

5

Et al Raul Vera Gimon

Carlos Socre

Liliam Viñas

Hector Salazar 2019

Tratamiento con radioterapia y quimioterapia en pacientes con carcinoma 4

“El tratamiento primario previa estadificación del cáncer del recto según el sistema TNM es actualmente la resección quirúrgica completa con fines curativos, en el caso de los tumores considerados irresecables para el momento del diagnóstico el tratamiento es radioterapia y quimioterapia.”