

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Medicina Humana**

**Nombre del alumno: Yamili Lisbeth Jiménez Arguello.**

**Nombre del docente: Dr. Yasuei Nakamura Hernández.**

**Nombre del trabajo: Fichas de trabajo.**

**Materia: Metodología de la investigación.**

**Grado: 7° Grupo: B.**

CAUSA MÁS FRECUENTE EN NIÑOS <6 AÑOS  
POR LA QUE PRESENTAN ENFERMEDADES  
DIARREICAS.

1

ELENA POUEA ALFONSO, ET. AL. 2019.

### ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

P.P.

Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día de heces sueltas o líquidas.

Hay tres tipos clínicos de enfermedades diarreicas:

- \* La diarrea acuosa aguda, que dura varias horas o días, y comprende el cólera.
- \* La diarrea aguda con sangre, también llamada diarrea disintérica o disenteria.
- \* La diarrea persistente, que dura 14 días o más.

CAUSA MAS FRECUENTE EN NIÑOS < 6 AÑOS  
POR LA QUE PRESENTAN ENFERMEDADES  
DIARREICAS

2

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2015.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)  
P.P

La diarrea es una enfermedad causada por virus (causa más frecuente), bacterias y parásitos que se encuentran en los alimentos contaminados, descompuestos o porque hay un mal hábito de higiene. La diarrea suelen ser muy agudas o líquidas, puede haber moco o sangre y las niñas y niños pueden tener calentura o vómito.

La diarrea si no se trata lo más pronto posible, va a requerir de medicamentos para curarla y si no se trata a tiempo, en niños y niñas puede deshidratarse.

CADA MAS FRECUENTE EN NIÑOS <6 AÑOS  
POR LA QUE PRESENTAN ENFERMEDADES  
DIARREICAS

3

## GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

### PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DIARREA AGUDA EN NIÑOS.

P.P.

La vacuna GE1/HRV es altamente protectora para gastroenteritis severa por rotavirus y segura con respecto al riesgo de invaginación intestinal. Recomendable aplicar la vacuna contra rotavirus, dos dosis, a los dos y cuatro meses de edad.

Fomentar la higiene y mejorar los sistemas de cloración doméstica.

Inicialmente el estudio de la exploración física se debe evaluar, en el niño/a con diarrea aguda, la presencia y grado de deshidratación.

CAUSA MAS FRECUENTE EN NIÑOS <6 AÑOS  
POR LA QUE PRESENTAN ENFERMEDADES  
DIARREICAS

4

ENRIQUETA ROHÁN RIECHMANN, ET. AL. 2017

DIARREA AGUDA

P.P.

La diarrea que causa la infección se produce cuando el volumen de agua y electrolitos que se presentan al colon excede su capacidad de absorción, eliminándose de forma aumentada por las heces.

Los agentes predominantes son *Salmonella* spp y *Campylobacter* spp, seguidos de *Shigella* spp, *Aeromonas* spp y *Yersinia* spp.

Los factores que influyen en la afectación nutricional son la disminución de la ingesta calórica por la hiporexia concomitante y la restricción alimentaria, y por último, la posible existencia de mala absorción de nutrientes secundaria a la lesión intestinal.