



Medicina Humana

Nombre del alumno: Luz Angeles Jiménez
Chamec

Nombre del profesor: Dr. Ricardo de Jesús
Aguilar Felipe

Nombre del trabajo: Mapas mentales
enfermedades herpéticas

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Clínica pediátrica


Grado y grupo: 7° B

Comitán de Domínguez Chiapas a 20 Octubre de 2023.

FARINGITIS HERPÉTICA


Definición

La infección primaria del virus del herpes simple tipo I (VHS- I)



Epidemiología

la seropositividad aumenta de un 17% a un 30% en los pacientes de 1 a 5 años de edad a un 60% a 85%



Diagnóstico

Clínica (lesiones orales ulcerativas), Cultivos, serología y PCR.





CUADRO CLÍNICO

Fiebre elevada (38.5-40°C), cefalea e irritabilidad, halitosis, salivación excesiva, aparición de lesiones orales, gingivitis, adenopatías cervicales dolorosas y rechazo a la ingesta de alimentos



Complicaciones

Queratitis herpética, Eczema herpeticum, Encefalitis herpética y Esofagitis



Tratamiento

Hidratación, analgésicos orales como el Ibuprofeno o paracetamol y antivirales por vía oral como es el Aciclovir



Tratamiento

- TRIFLURIDINA: AL1% EN GOTAS 9 VECES POR DIA
- VIDARABINA: AL 3 % UNGÜENTO 5 VECES POR DÍA.
- ACICLOVIR: ORAL 400 MG, 5 VECES POR DÍA POR 10 DÍAS




Diagnóstico

- CLINICA
- EXAMEN CON LÁMPARA DE HENDIDURA
- PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (NAAT)




Definición

- ES UNA INFECCIÓN VIRAL DEL OJO, CAUSADA POR EL VIRUS DEL HERPES SIMPLE (VHS). ESTA INFECCIÓN PUEDE AFECTAR A DIFERENTES CAPAS DE LA CÓRNEA Y PRODUCIR UNA REACCIÓN INFLAMATORIA. TAMBIÉN PUEDE INFECTAR LAS ESTRUCTURAS MÁS PROFUNDAS DEL OJO COMO EL IRIS Y CAUSAR UNA INFLAMACIÓN DENTRO DEL OJO.



Fisiopatología

1. EXPOSICIÓN A LA LUZ INTENSA
2. FIEBRE
3. MENSTRUACIÓN
4. ESTRÉS FÍSICO SIGNIFICATIVO
5. INMUNOSUPRESIÓN
6. USO DE CORTICOSTEROIDES



Queratoconjuntivitis herpética

Síntomas

- TÍPICAMENTE APARECE COMO UNA CONJUNTIVITIS
- BLEFAROCONJUNTIVITIS
- MARCADA POR VESÍCULAS
- ÚLCERAS QUE PUEDEN INCLUIR LESIONES DENDRÍTICAS EN EL EPITELIO CORNEAL



Manifestaciones

- QUERATITIS EPITELIAL INFECCIOSA
- QUERATOPATÍA NEUROTRÓFICA
- QUERATITIS ESTROMAL
- QUERATITIS ENDOTELITIS



Complicaciones

- INFLAMACIÓN Y LESIÓN CORNEAL QUE PUEDE ACABAR CON UNA CICATRIZ EN LA CÓRNEA
- ÚLCERAS ABIERTAS CON RIESGO DE SOBREENFECCIÓN POR BACTERIAS
- INFECCIONES VIRALES CRÓNICAS O RECURRENTES DE LA CÓRNEA
- INFLAMACIÓN CRÓNICA DE LA CÓRNEA
- DISMINUCIÓN TEMPORAL



- EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, LA DEBILIDAD ES TEMPORAL Y MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE CON EL TRANCURSO DE LAS SEMANAS. LA DEBILIDAD HACE QUE LA MITAD DE LA CARA SE VEA CAÍDA. ESTE ES PROVOCADO POR EL VIRUS DEL HERPES ZÓSTER ÓTICO

¿POR QUE SUCEDE?

- INFECCIONES VÍRICAS (SE HA RELACIONADO CON EL VIRUS DEL HERPES SIMPLE, VARICELA, GRIPE Y EL QUE PROVOCA MONONUCLEOSIS).
- INFECCIÓN POR UNA BACTERIA QUE TRANSMITEN LAS GARRAPATAS Y PRODUCE LA "ENFERMEDAD DE LYME"; COMO UNA COMPLICACIÓN DE UNA OTITIS.
- UN GOLPE EN UN LADO DE LA CABEZA; POR TENSIÓN ARTERIAL ELEVADA O UN TUMOR.

PREVENCIÓN

- LA MEJOR MANERA DE EVITAR ESTA ENFERMEDAD ES EVITANDO CONTAGIARSE DE HERPES, MEDIANTE LA VACUNACIÓN Y EL CONTACTO CON PERSONAS INFECTADAS



DEFINICIÓN

- TAMBIÉN CONOCIDA COMO PARALISIS DE BELL ES UNA DEBILIDAD O AUSENCIA DE MOVILIDAD DE LOS MÚSCULOS DE UN LADO DE LA CARA.



Parálisis facial herpética



TRATAMIENTO

- CORTICOIDES
- MED. ANTIVIRALES
- FISIOTERAPIA
- CIRUGÍA
- ELECTROESTIMULACIÓN
- LUBRICANTE OCULAR



CAUSAS

1. HERPES LABIAL Y GENITAL
2. MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
3. ENFERMEDAD DE MANOS, PIES Y BOCA
4. VARICELA
5. CITOMEGALOVIRUS
6. SARAMPIÓN



SINTOMAS

- ASIMETRÍA EN LA CARA
- LA CEJA DEL LADO AFECTADO ESTÁ CAÍDA, NO LA PUEDEN LEVANTAR, NI ARRUGAR LA FRENTE.
- HAY DIFICULTAD PARA CERRAR EL OJO, POR LO QUE PARECE QUE ESTÁ MÁS ABIERTO QUE EL OTRO Y TIENE LAGRIMEO.



DIAGNOSTICO

- ELECTROMIOGRAFIA
- EXPLORACIONES POR IMAGÉN
- ANÁLISIS DE SANGRE

