



DERECK HARPER NARCIA
UNIVERSIDAD DEL SURESTE
SÉPTIMO SEMESTRE
GRUPO B
“MAPAS MENTALES”
MEDICINA HUMANA

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

cuadro clinico

La infección inicial (primaria) suele ser una forma inespecífica de conjuntivitis autolimitada que a menudo aparece en la primera infancia y habitualmente no se asocia con afectación corneana. Cuando está afectada la córnea, los síntomas incluyen sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia e hiperemia conjuntival. A veces sigue una blefaritis vesiculosa (vesículas en los párpados), los síntomas empeoran, la visión se vuelve borrosa y las vesículas se rompen y se ulceran; luego desaparecen en el plazo de una semana sin dejar cicatriz

01

QUERATOCONJUNTIVITIS HERPÉTICA




04

Diagnóstico

- Examen con lámpara de hendidura

02



Definición

La queratitis por herpes simple es la infección corneana por el virus herpes simple. Puede afectar el iris. Los signos y síntomas incluyen sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia e hiperemia conjuntival. Las recurrencias pueden provocar en la córnea hipoestesia, ulceración, cicatrización permanente, opacidades, adelgazamiento del estroma corneano y disminución de la visión.

05

Tratamiento

- Ganciclovir o trifluridina tópicos
- Aciclovir o valaciclovir por vía oral o IV
- Para la afectación del estroma o la uveítis, corticoides tópicos además de los agentes antiviricos

03



06

Dereck Harper Narcia

DEFINICION

La parálisis facial es una debilidad o ausencia de movilidad de los músculos de un lado de la cara. Esto sucede cuando el nervio facial, que controla dichos músculos, se daña en algún punto de su recorrido deja de funcionar.

CUADRO CLINICO

Los principales síntomas consisten en una asimetría en la cara. La ceja del lado afectado está caída, no la pueden levantar, ni arrugar frente. Hay dificultad para cerrar el ojo, por lo que parece que está más abierto que el otro y tiene lagrimeo.

DIAGNOSTICO

No existe una prueba diagnóstica concreta, una historia médica detallada y exploración del niño es lo que más va a ayudar al pediatra a orientar el diagnóstico y solicitar las pruebas necesarias.

PREVENCIÓN

Ahora los niños reciben vacunas contra la varicela de manera rutinaria, lo que reduce en gran medida las posibilidades de infectarse con el virus de la varicela.



ESTRATEGIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non orci hendrerit augue interdum lacinia at egestas dolor. Vivamus elementum pulvinar tempus.

PARALISIS FACIAL HERPÉTICO

CAUSAS

Puede deberse a diversos motivos: infecciones viricas (se ha relacionado con el virus del herpes simple, varicela, gripe y el que provoca mononucleosis); infección por una bacteria que transmiten las garrapatas produce la "Enfermedad de Lyme"; como una complicación de una otitis; un golpe en un lado de la cabeza; por tensión arterial elevada o un tumor.

TRATAMIENTO

El tratamiento va a depender de la causa. Las infecciones por bacterias como una otitis o la enfermedad de Lyme precisarán tratamiento con antibióticos. Si hay una fractura en el cráneo que comprime al nervio puede ser necesaria la cirugía.

DERECK HARPER NARCIA

FARINGITIS HERPÉTICA

Definición

ES UNA INFECCIÓN VIRAL DE LA BOCA QUE OCASIONA LLAGAS Y ÚLCERAS. ESTAS ÚLCERAS BUCALES NO SON LO MISMO QUE LAS AFTAS, LAS CUALES NO SON CAUSADAS POR UN VIRUS.

Causas

La estomatitis herpética es una infección causada por el virus del herpes simple (VHS) herpes oral. Los niños pequeños comúnmente la contraen cuando se exponen por primera vez al VHS.

Colaboraciones con marcas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut a enim nec nisl ullamcorper eleifend. Praesent risus leo, fringilla et ipsum.

Diagnóstico

En la mayoría de los casos el proveedor de atención médica de su hijo puede diagnosticar esta afección observando las úlceras bucales del niño.

Tratamiento

-Aciclovir, un medicamento que su hijo toma para combatir el virus que causa la infección.

-Un anestésico (lidocaina viscosa), que se puede aplicar en la boca del niño para aliviar el dolor intenso.

cadro clínico

- Ampollas en la boca, a menudo en la lengua, paladar.
- las mejillas, el
- Disartria
- Irritabilidad
- Fiebre
- Encías inflamadas



DERECK HARPER NARCIA

BIBLIOGRAFÍA

https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/infecciones_por_virus_herpes_simple_.pdf

<https://scielo.isciii.es/pdf/ami/v24n1/nota3.pdf>

<https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc132zc.pdf>