



¿Que es?

La gingivostomatitis herpética es la manifestación clínica más frecuente de la infección primaria del virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1) – el mismo que produce los herpes labiales recurrentes– en la infancia, produciendo lesiones orales ulcerativas muy dolorosas.

INCIDENCIA

Es una enfermedad propia de la infancia, más frecuente en lactantes y niños menores de 6 años. Sin embargo, aunque más infrecuente, se han descrito casos en adolescentes y adultos.

TRANSMISION

la transmisión suele ocurrir de forma directa por gotitas de saliva o contacto directo con las secreciones de personas infectadas como padres o cuidadores que presentan reactivación de algún herpes labial o a través de otros niños infectados.

SINTOMAS

Fiebre leve, malestar general, Halitosis, aparición de lesiones orales, gingivitis, adenopatías cervicales dolorosas

FARINGITIS HERPETICA


DIAGNOSTICO

- cultivos virales
- Serología
- PCR

Tratamiento

- Analgésicos orales como el paracetamol o ibuprofeno
- Alocclair
- Aciclovir





¿Que es?

La queratitis herpética es una infección viral del ojo, causada por el virus del herpes simple (VHS). Existen dos tipos principales del virus.

TRANSMISION

El herpes tipo I es muy contagioso y frecuentemente se transmite por contacto con la piel de alguien que tiene el virus. Casi toda la población, aproximadamente el 90 %, está expuesta al herpes tipo I, usualmente durante la infancia.



SINTOMAS

Los síntomas de una reactivación incluyen lagrimeo, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño en el ojo y sensibilidad a la luz brillante. En raros casos puede que la infección empeore y la córnea se inflame, produciendo vista borrosa.

QUERATO CONJUNTIVITIS HERPETICA

INCIDENCIA

el impacto global se calcula en aproximadamente 1 a 1,5 millones de casos.

DIAGNOSTICO

- Exploración ocular
- Cultivo o laboratorio

Tratamiento

- Colirios antivirales
- Medicamentos antivirales por vía oral o intravenosa
- Colirios con corticoesteroides y colirios dilatadores
-
-





¿Que es?

El síndrome de Ramsay-Hunt consiste en una parálisis facial periférica, producida por el virus herpes zóster, acompañada de un exantema eritematoso-vesicular que afecta al oído externo o cavidad oral ipsilateral y que puede extenderse a otras localizaciones adyacentes

INCIDENCIA

Se trata de un cuadro de evolución aguda, cuya incidencia aproximada es de 15 a 35 casos por 100.000 habitantes y año, sin registrarse diferencias significativas en cuanto a raza o distribución geográfica.

TRANSMISION

no es contagioso. Sin embargo, la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no han tenido varicela anteriormente o que no han sido vacunadas contra ella.

PARALISIS FACIAL HERPETICA

DIAGNOSTICO

Los médicos a menudo pueden identificar el síndrome de Ramsay Hunt **sobre la base de los antecedentes médicos, un examen físico y los signos y síntomas distintivos del trastorno.**

SINTOMAS

- Dolor de oído.
- Pérdida de la audición.
- Zumbido en los oídos (tinnitus)
- Dificultad para cerrar un ojo.
- Una sensación de girar o moverse (vértigo)
- Un cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto.
- Boca y ojos secos

Tratamiento

- Prednisona
- Valaciclovir
- Aciclovir
- Hipromelosa