

Brenda Nataly Galindo Villarreal

Ricardo de Jesús Aguilar Felipe

Nombre del trabajo: Mapa mental

Clínicas Pediátrica

Grado: 7mo Semestre

Grupo: "B"

Carrera: Medicina Humana


TX

- TRIFLURIDINA
- ACICLOVIR
- VIDARABINA



DIAGNÓSTICO

- CLÍNICA
- EXAMEN CON LÁMPARA DE HENDIDURA
- PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS (NAAT)



DEFINICIÓN


INFECCIÓN VIRAL DEL OJO CAUSADA POR EL VIRUS DEL HERPES SIMPLE. EXISTEN DOS TIPOS PRINCIPALES DEL VIRUS. MÁS COMÚN TIPO 1 INFECTA MAYORMENTE LA CARA= HERPES LABIAL O AMPOLLA FEBRIL

QUERATOCONJUNTIVITIS HERPETICA

MANIFESTACIONES CLINICAS

4 CATEGORIAS:

- QUERATITIS EPITELIAL INFECCIOSA
- QUERATOPATÍA NEUROTROFICA
- QUERATITIS ESTROMAL
- QUERATITIS ENDOTELITIS



AFECTA A DIFERENTES CAPAS DE LA CORNEA Y PRODUCIR UNA REACCIÓN INFLAMATORIA, PUEDE INFECTAR LAS ESTRUCTURAS PROFUNDAS DEL OJO COMO EL IRIS Y CAUSAR INFLAMACION DENTRO DEL OJO

FISIOPATOLOGÍA

LA INFECCIÓN PRIMARIA SE RESUELVE SIN TRATAMIENTO Y EL VIRUS INACTIVADO SE ESCONDE EN NERVIOS



DEFINICIÓN

La parálisis facial periférica es una debilidad o ausencia de movilidad de los músculos de un lado de la cara.

- Parálisis de Bell
- *Síndrome de Ramsay-Hunt*



POR QUE SUCEDE

- infecciones víricas
- infecciones por una bacteria que transmiten las garrapatas
- por parálisis facial idiopática (niños)



Parálisis Facial Herpética

DX Y TX

- dx:
- electromiografía
 - exploraciones por imagen
 - análisis de sangre
- tx:
- prednisona, valaciclovir, aciclovir, rehabilitación

MANIFESTACIONES CLINICAS

- imposibilidad de subir las cejas
- cerrar los ojos
- mover los músculos de la mejillas
- sonrier
- mover los labios

CAUSAS

- herpes labial y genital
- mononucleosis
- enfermedad de manos, pies y boca
- varicela y culebrilla
- sarampion



DEFINICIÓN

La parálisis facial periférica es una debilidad o ausencia de movilidad de los músculos de un lado de la cara.

- Parálisis de Bell
- *Síndrome de Ramsay-Hunt*



POR QUE SUCEDE

- infecciones víricas
- infecciones por una bacteria que transmiten las garrapatas
- por parálisis facial idiopática (niños)



Parálisis Facial Herpética



DX Y TX

- dx:
- electromiografía
 - exploraciones por imagen
 - análisis de sangre
- tx:
- prednisona, valaciclovir, aciclovir, rehabilitación

MANIFESTACIONES CLINICAS

- imposibilidad de subir las cejas
- cerrar los ojos
- mover los músculos de la mejillas
- sonrier
- mover los labios

CAUSAS

- herpes labial y genital
- mononucleosis
- enfermedad de manos, pies y boca
- varicela y culebrilla
- sarampion