

Nombre del Alumno

Diana Patricia Castillejos López

Nombre del tema

Crisis convulsiva

Parcial

Tercer parcial

Nombre de la Materia

Enfermería en Urgencias y Desastres

Nombre del profesor

Cecilia De La Cruz Diaz

Nombre de la Licenciatura

Lic. Enfermería

Cuatrimestre

Septimo cuatrimestre

CRISIS CONVULSIVA

Movimientos súbitos, descontrolados del cuerpo y cambios en el comportamiento que se presentan por una actividad eléctrica anormal en el cerebro.

Las crisis convulsivas se presentan por efectos de medicamentos, fiebres altas, lesiones en la cabeza y enfermedades tales como la epilepsia.



Primeros auxilios: Convulsiones



Los síntomas incluyen pérdida de conciencia, cambios emocionales, pérdida de control muscular y temblores.



- Observar la crisis epiléptica, describiendo y registrando el orden cronológico y su duración.
- Observar el inicio, describiendo y registrando la hora de inicio y conducta previa (llanto, movimientos estereotipados...); los factores desencadenantes (estimulación luminosa/auditiva/sensitiva/emocional fiebre, sueño, alcohol, hipo/hiperventilación, menstruación...).
- Observar los movimientos, describiendo y registrando los cambios de posición y sitio de comienzo (mano, pulgar, boca o generalizadas); fase tónica, si la hay; fase clónica (sacudidas, partes corporales afectadas, características en general).
- Observar la cara, describiendo y registrando cambios de color (palidez, cianosis o enrojecimiento) y transpiración.
- Observar la boca, describiendo y registrando la posición, desviación de la comisura, mordedura de la lengua...
- Observar los ojos, describiendo y registrando la posición (hacia adelante, arriba, los lados o movimientos divergentes); las pupilas (cambio de tamaño, igualdad y reacción a la luz).

1. Fase ictal

Si se reconocen los signos y da tiempo, ayudar al paciente a sentarse o ir a la cama antes de que empiece la crisis.

1. Mantener la calma y tranquilizar al paciente y familia.
2. Garantizar de que el paciente esté en un entorno seguro.
3. Controlar, pero permitir, todo tipo de movimiento convulsivo.
4. Asegurar la vía aérea.
5. Observar la forma de inicio de la crisis y el desarrollo de la misma.
6. Controlar con reloj la duración de la crisis.

Fase postictal

- Observar los síntomas sin interferir.
- Observar el nivel de conciencia y orientación temporoespacial.
- Administrar oxígeno si es posible.
- Brindar ayuda sin imponerla.
- Observar el tiempo de duración de esta fase.
- Registrar de forma minuciosa y pormenorizada en la historia del paciente todos los datos recogidos.

