

*Nombre del Alumno: José Andrés cantoral
acuña*

Nombre del tema: cuadro comparativo

Parcial: 4

*Nombre de la Materia: enfermería en
urgencias y desastres.*

*Nombre del profesor: CECILIA DE LA
CRUZ SANCHEZ*

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7



Mi Universidad

Una emergencia o urgencia psiquiátrica es una condición aguda o crónica que requiere una intervención psiquiátrica: intento de suicidio, abuso de sustancias, psicosis, conducta agresiva, crisis de angustia (ataques de pánico), trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático.

Nombre de la urgencia	Definición.	Causa.	síntomas	tratamiento
intento de suicidio	Es el acto del intento de quitarse deliberadamente la propia vida.	<ul style="list-style-type: none"> Trastorno bipolar Trastorno límite de la personalidad Depresión Consumo de drogas o alcohol Trastorno de estrés postraumático (TEPT) Esquizofrenia 	<ul style="list-style-type: none"> Tener dificultad para concentrarse o pensar claramente Regalar las pertenencias Hablar acerca de marcharse o la necesidad de "dejar todos mis asuntos en orden" Cambio repentino en el comportamiento, sobre todo calma después de un período de ansiedad Pérdida de interés en actividades que solía disfrutar 	<ul style="list-style-type: none"> Creen que nada va a ayudar. No desean contarle a nadie que tienen problemas. Piensen que buscar ayuda es un signo de debilidad. No saben adónde acudir por ayuda.
abuso de sustancias	El abuso de sustancias se refiere al uso de sustancias, tales como el alcohol y las drogas, de un modo que genera daños a la salud y a las relaciones.	Para sentirse bien. Para desempeñarse mejor. Por curiosidad y presión social.	<ul style="list-style-type: none"> Somnolencia. Temblores. Ojos enrojecidos, pupilas dilatadas. Falta de interés en la higiene personal y aspecto descuidado. Arrastrar las palabras. Pérdida o aumento del apetito. Movimientos descoordinados. Ojeras. 	<p>Terapia conductual Ayudarte a adquirir formas de enfrentar tu compulsión a las drogas. Sugerir estrategias para evitar las drogas y prevenir recaídas. Ofrecer sugerencias sobre cómo tratar una recaída, si es que ocurre. Hablar sobre temas relativos a tu trabajo, tus problemas legales y tus relaciones con familia y amigos.</p>
psicosis	se refiere a un conjunto de síntomas que afectan la mente y que hacen que se pierda cierto contacto con la realidad.	Alcohol y ciertas drogas ilícitas, tanto durante su consumo como durante la abstinencia · Enfermedades cerebrales, como el mal de Parkinson.	tienen delirios (creencias falsas, por ejemplo, de que las personas en la televisión les envían mensajes especiales o que otros intentan hacerles daño) y alucinaciones.	La clozapina, que bloquea muchos otros receptores, es claramente el fármaco más efectivo para tratar los síntomas psicóticos. No obstante, se utiliza poco debido a sus graves efectos secundarios y a que requiere un seguimiento periódico mediante análisis de sangre.
conducta agresiva	estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto, pretender herir física y o psicológicamente a alguien.	La agresividad puede estar causada por trastornos del estado de ánimo, psicosis	<ul style="list-style-type: none"> Ira. Irritabilidad. Aumento de energía. Pensamientos acelerados. Hormigueo. Temblores. Palpitaciones. Opresión en el pecho. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconocer la causa del comportamiento agresivo. ... Intentar no discutir fuerte o pelearse. ... Autocontrol. ... Responder a las bromas con asertividad. ... Convencer a los demás con tolerancia. ... Negociar con respeto.
crisis de angustia	Una crisis de angustia (ataque de pánico) se define como la aparición brusca de un período definido y breve de malestar o miedo intenso acompañado de algunos síntomas somáticos y/o cognitivos.	<ul style="list-style-type: none"> Trauma. ... Estrés debido a una enfermedad. ... Acumulación de estrés. ... Personalidad. ... Otros trastornos mentales. ... Tener familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. ... Drogas o alcohol. 	Dolor o molestias torácicos. Sensación de asfixia. Mareo, inestabilidad o desmayos. Miedo a morir. Miedo a volverse loco o a perder el control. Sentimientos de irrealidad o de extrañamiento en relación con el propio entorno. Sofocos o escalofríos.	<p>Tratamiento de la crisis de angustia y trastorno de angustia Antidepresivos y/o ansiolíticos. Psicoterapia, que incluye terapia de exposición, terapia cognitivo-conductual y psicoterapia interpersonal.</p>