



Mi Universidad

Mapa conceptual.

Nombre del Alumno: **HERNÁNDEZ URBINA ANTONIO RAMÓN.**

Nombre del tema: **CRISIS CONVULSIVAS Y EPILEPSIA.**

Parcial: **TERCERO.**

Nombre de la Materia: **CLINICAS DE PEDIATRIA.**

Nombre del profesor: **DR. SAMAYOA MIJANGOS MARCO ANTONIO.**

Nombre de la Licenciatura: **MEDICINA HUMANA.**

Cuatrimestre: **SEPTIMO**

CRISIS CONVULSIVA Y EPILEPSIA.

TIPOS DE CRISIS:

CRISIS GENERALIZADA:

CRISIS PARCIALES:

CRISIS TÓNICAS:

contracciones musculares mantenida (segundos a minutos), generalmente simétricas y bilaterales, que causan caída.

CRISIS DE AUSENCIAS:

desconexiones de inicio súbito, con detención de la actividad, 5-15 segundos. No se pierde el tono muscular.

Manifestaciones clínicas variables, relacionadas con las funciones del área cortical donde estas se originan.

CRISIS CLÓNICAS:

contracción/relajación muscular repetidas con cierto componente rítmico. Disminución progresiva de intensidad y frecuencia al remitir.

AUSENCIAS ATÍPICAS:

inicio y final menos brusco, más prolongadas, con confusión posterior.

EPILEPSIA:

TÓNICO – CLÓNICAS GENERALIZADAS:

Síntomas autonómicos prominentes: cianosis, apnea, aumento de FC y TA. Se puede producir relajación de esfínteres

GENERALIZADA:

involucran ambos hemisferios cerebrales desde el inicio.

FOCAL O PARCIAL: afectan solo una parte del hemisferio.