



Mi Universidad

Actividad 4

Nombre del Alumno: Toni Edilberto Morales Lopez

Nombre del tema: fisiopatología nutricional, obesidad

Parcial: cuarto Parcial

Nombre de la Materia: Fisiopatología I

Nombre del profesora: Ernesto Trujillo Lopez

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura En Enfermería

Cuatrimestre: Cuarto Cuatrimestre

¿Qué es la fitopatología de la nutrición?

Es la alteración y patologías nutricionales

¿Cuáles son los síndromes de alteración nutricionales?

Los trastornos nutricionales son nutrición y la desnutrición excesiva

¿Que es la desnutrición?

Síndrome dietico originado por deficiente en relación con los requerimientos fisiológicos

¿Cuáles son los mecanismo y causas de la desnutrición?

Falta de nutrientes, alteración de la ingesta, alteración de la digestión

¿en que consiste la desnutrición a corto plazo?

Causa la pérdida de los deposito energético y masa muscular

¿en qué consiste la desnutrición a largo plazo?

Consecuencia sobre regulaciones energéticas, retraso en crecimiento y desnutrición crónico

¿Cuáles son los tipos de desnutrición?

Kwashiorkor-marasmo

¿según la organización panamericana de salud ¿Cuál es el IMC de un adulto obeso?

≥ 30

¿Cuál es la fórmula para sacar el IMC?

Peso/talla²

¿Trastorno frecuente de un obeso?

Disgusto de su propia imagen, depresión, hiperfagia

Las alteraciones y patologías nutricionales son, hoy en día, uno de los problemas que afectan en mayor medida a nuestra sociedad en diferentes contextos.x

Se trata de un síndrome de origen dietético producido por una excesiva ingestión de alimentos en relación con los requerimientos fisiológicos del individuo.

1 ¿La desnutrición se clasifica en 2 tipos principales?

- a) **Forma primitiva y secundaria**
- b) plazo corto y largo
- c) alteración de la ingesta y absorción

2 ¿se trata de un síndrome de origen dietético producido por una excesiva ingestión de alimentos?

- a) Anorexia
- b) Obesidad**
- c) nutrición excesiva

3 ¿otro trastorno frecuente en los obesos son las alteraciones de?

- a) Pérdida de energía
- b) Pérdida de ingesta
- c) la propia imagen corporal**

4 ¿esto obesidad es más frecuente en varones y asociada a riesgos cardiovasculares?

- a) Obesidad en glúteo femoral
- b) obesidad abdominal**
- c) obesidad

5 ¿esto obesidad es más frecuente en mujeres premenopáusicas no comportan riesgos cardiovasculares?

- a) Obesidad glúteo femoral**
- b) obesidad abdominal
- c) Obesidad

6 ¿Es la disminución de la ingesta puede ser voluntario o por anorexia?

- a) Alteración digestiva y de absorción
- b) alteración de motilidad
- c) alteración de la ingesta**

7 ¿En qué año se produce la nutrición excesiva en la infancia?

- a) En los primeros años de vida**
- b) en los últimos años de infancia
- c) en los años intermedios de la infancia

8 ¿Este tipo de desnutrición es causada por pérdida depósito de energía y masa muscular?

- a) A corto plazo**
- b) A largo plazo
- c) A mediano plazo

9 ¿Este tipo de desnutrición se da en la infancia también producido por consecuencia de la regulación energética?

- a) A corto plazo
- b) A largo plazo**
- c) A mediano plazo

10 ¿Este es provocado por lesiones en el núcleo del hipotálamo Que lleva comer en exceso y a la obesidad?

- A) Trastorno nervioso
- B) Trastorno neurológico**
- C) Trastorno motriz

11.- es un síndrome de origen dietético originado por **un deficiente** consumo de nutrientes.

12.- se cree que hay factores nerviosos **centrales y periféricos** que contribuyen a la anorexia y la caquexia.

13.- durante **la inanición** los depósitos de energía se agota velocidades distintas