



Mi Universidad

Actividad 3

NOMBRE DEL ALUMNO: Kenny Janeth Hernández morales


TEMA: principales complicaciones durante el embarazo


PARCIAL: 2

MATERIA: enfermería del cuidado de la mujer

NOMBRE DEL PROFESOR: Lic. Romelia de león
Méndez

LICENCIATURA: Enfermería





El trabajo de parto prematuro

Es un trabajo de parto que comienza antes de la semana 37 de embarazo.

Bebé que nazca antes de las 37 semanas tiene mayor riesgo de tener problemas de salud

Aborto espontáneo

Es el término utilizado para describir la pérdida del embarazo por causas naturales antes de las 20 semanas

Los signos pueden incluir manchado o sangrado vaginal

Calambres o pérdida de líquido o tejido por la vagina.

La pérdida del embarazo después de la semana 20 del embarazo se denomina mortinatalidad.

Las mujeres con hiperémesis gravídica

Experimentan náuseas que no desaparecen

Pérdida de peso

Disminución del apetito, deshidratación

Las mujeres afectadas podrían requerir hospitalización para poder recibir líquidos y nutrientes

Las mujeres embarazadas necesitan más hierro de lo normal

Debido a que durante el embarazo producen mayor cantidad de sangre

La anemia por deficiencia de hierro

Se asocia a partos prematuros y a bajo peso al nacer