



**Cuadro sinoptico**

*Nombre del Alumno: Toni Edilberto morales lopez*

*Nombre del tema: principales complicaciones de un embarazo*

*Parcial: tercer parcial*

*Nombre de la Materia: cuidado de la mujer*

*Nombre del profesora: Romelia De Leon Mendez*

*Nombre de la Licenciatura: licenciatura en Enfermeria*

*Cuatrimestre: Cuarto cuatrimestre*



Principales complicaciones durante el embarazo

Estas complicaciones pueden afectar la salud de la madre, la salud del feto o la de ambos. Incluso las mujeres que estaban sanas antes de quedar embarazadas pueden tener complicaciones. Estas complicaciones pueden hacer que el embarazo sea un embarazo de alto riesgo.

Recibir cuidados prenatales regulares desde el inicio del embarazo puede ayudar a disminuir el riesgo de tener problemas, ya que permite a los proveedores de atención médica diagnosticar, tratar o manejar afecciones antes de que se vuelvan serias

Cuidados prenatales también puede ayudar a identificar problemas de salud mental relacionados con el embarazo, como ansiedad y depresión.

La presión arterial alta, también denominada hipertensión

ocurre cuando se estrechan las arterias que transportan la sangre del corazón a los órganos del cuerpo.

Durante el embarazo, esto puede dificultar el pasaje de la sangre hasta la placenta, la cual le proporciona nutrientes y oxígeno al feto

La reducción del flujo sanguíneo puede enlentecer el crecimiento del feto y aumentar el riesgo para la madre de trabajo de parto prematuro y preclamsia.

En general, la hipertensión gestacional ocurre durante la segunda mitad del embarazo y desaparece después del parto

Las infecciones, incluidas algunas infecciones de transmisión sexual

pueden ocurrir durante el embarazo y/o el parto y pueden ocasionar complicaciones para la mujer embarazada, el embarazo y el bebé después del parto

Muchas de estas infecciones se pueden prevenir o tratar con cuidados adecuados previos a la concepción, prenatales y de seguimiento posterior al parto

Algunas complicaciones frecuentes del embarazo son, entre otras, las siguientes

Algunas infecciones durante el embarazo pueden causar o contribuir a lo siguiente

- Pérdida del embarazo/aborto espontáneo (antes de las 20 semanas de embarazo)
- Embarazo ectópico (cuando el embrión se implanta fuera del útero, habitualmente en una trompa de Falopio)
- Trabajo de parto y parto prematuros (antes de completar 37 semanas de embarazo)
- Bajo peso al nacer
- Defectos de nacimiento, incluidos ceguera, sordera, deformidades óseas y discapacidad intelectual
- Mortinatalidad (a las 20 semanas de embarazo o después)
- Enfermedad durante el período neonatal (primer mes de vida)
- Muerte neonatal
- Complicaciones de salud de la madre