

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUADRO SINÓPTICO UNIDAD IV. DISTOCIA

MVZ. SERGIO CHONG VELAZQUEZ

VICTOR HUGO BALBOA CASTILLO

29 DE NOVIEMBRE DE 2023

DISTOCIA

Significa "parto difícil". La distocia representa un riesgo vital no sólo para la cría, sino para la madre también. Muchas variables pueden causar distocia, algunas se pueden prevenir, pero otras requieren de interpretación y acción inmediatas.

Dos síntomas que revelan un probable problema de distocia:

- Tiempo prolongado de esfuerzo de la parturienta (más de 8 horas)
- Evidencia de mal posicionamiento del feto.

Causas mediatas

HEREDITARIAS

Factores hereditarios pueden afectar a la madre directamente o al producto, las causas hereditarias que afectan a la madre se mencionan la hernia inguinal de la parturienta, el doble cérvix, la hipoplasia de la vagina y la vulva son también causas mediatas de distocia.

NUTRICIONALES Y DE MANEJO

Se dan dos situaciones:

- a) Las vaquillas están subdesarrolladas por mala nutrición.
- b) las becerras se sirven o montan a peso o tamaño inadecuado, por lo que los animales llegan al parto en situación riesgosa dado el insuficiente desarrollo pelviano o del canal del parto

INFECCIOSAS

Las infecciones del útero grávido pueden producir problemas de distocia, principalmente debido a que provocan inercia del útero.

Causas inmediatas

Las causas inmediatas de distocia se presentan el momento del parto, sin que se pueda hacer nada al momento de la monta para prevenirlas. Se dividen estas en causas maternas y en causas fetales.

CAUSAS MATERNAS

Dentro de las causas inmediatas de distocia hay un grupo que afecta de manera directa a la madre como son:

- Falta de dilatación del cérvix
- Anomalías vaginales y o vulvares
- Tumores que obstaculizan el paso del producto
- Inercia primaria uterina o falta de contracciones uterinas.

CAUSAS FETALES

Estas son más comunes que las causas maternas y, en general, se deben a fallas en la presentación, posición y actitud del feto al momento del parto. Las anomalías de presentación, posición y postura son causas relativamente frecuentes de las distocias en bovinos.

MANIOBRAS OBSTETRICAS

Estas son movimientos con las manos que se realizan por los veterinarios para conocer la posición del feto y realizar la recomendación sobre el nacimiento.

La resolución de la distocia puede hacerse aplicando diversas maniobras obstétricas tales como:

- a) Mutación
- b) Extracción forzada
- c) Fetotomía
- d) Operación cesárea

BIBLIOGRAFÍA

Antología Institucional de la Universidad del Sureste de la materia de Fisiología de la Reproducción

https://www.engormix.com/lecheria/manejo-parto-bovino/obstetricia-neonatalogia-bovina-maniobras_a42374/