

PASIÓN POR EDUCAR

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TAPACHULA**

U D S
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MATERIA: “Fisiología de la reproducción”

- **MVZ. Sergio Chong Velazquez**

- **ALUMNO: CHRISTIAN VALERIA FIGUEROA VICTORIA**
Cuarto cuatrimestre

D

¿QUÉ ES?

significa "parto difícil". La distocia representa un riesgo vital no sólo para la cría, sino para la madre también.

I

SINTOMAS

Dos síntomas que revelan un probable problema de distocia:

1. Tiempo prolongado de esfuerzo de la parturienta (más de 8 horas)
2. Evidencia de mal posicionamiento del feto.

S

T

CAUSAS MEDIATAS

Las causas mediatas de la distocia se pueden prevenir o eliminar, siendo estas las siguientes:

1. Hereditarias o genéticas
2. Nutricionales y de manejo
3. Infecciosas

O

CAUSAS HEREDITARIAS

Dentro de las causas hereditarias que afectan a la madre se menciona la hernia inguinal de la parturienta que, cuando se presenta, evita que la madre ejerza una buena presión abdominal al momento del parto, produciéndose con esto no sólo la falta de dilatación del cérvix sino también la falla en la expulsión del producto.

C

CAUSAS NUTRICIONALES

Se dan dos situaciones:

- a) Las vaquillas están subdesarrolladas por mala nutrición.
- b) las becerras se sirven o montan a peso o tamaño inadecuado, por lo que los animales llegan al parto en situación riesgosa dado el insuficiente desarrollo pelviano o del canal del parto, sobre todo producto es un macho de gran tamaño.

I

A

CAUSAS INFECCIOSAS

Las infecciones del útero grávido pueden producir problemas de distocia, principalmente debido a que provocan inercia del útero.

D

Causas inmediatas de distocia

Las causas inmediatas de distocia se presentan el momento del parto, sin que se pueda hacer nada al momento de la monta para prevenirlas. Se dividen estas en causas maternas y en causas fetales.

I

Causas maternas

Dentro de las causas inmediatas de distocia hay un grupo que afecta de manera directa a la madre como son:

- Falta de dilatación del cérvix
- anomalías vaginales y o vulvares
- Tumores que obstaculizan el paso del producto
- Inercia primaria uterina o falta de contracciones uterinas.

S

T

Causas fetales

La primera (de presentación) se refiere a la relación del largo fetal con el canal del parto. La segunda (de posición y postura), a la parte del feto que esta más próxima al raquis de la madre.

Así, la presentación puede ser: anterior, posterior, transversa, dorsotransversa y ventrotransversa.

Con respecto a la posición esta puede ser dorsal, ventral o lateral.

La postura se refiere a desviaciones o desplazamientos de una parte del feto de miembros o cabeza.

Otras causas de distocia de origen fetal son las teratológicas como bicefalos, feto doble, etcétera.

O

C

Maniobras obstétricas

La resolución de la distocia puede hacerse aplicando diversas maniobras obstétricas tales como:

- Mutación
- Extracción forzada
- Fetotomía
- Operación cesárea

I

mutacion

Comprende una serie de maniobras encaminadas a corregir presentación, posición y/o postura del feto, como son:

Repulsión. Consiste en empujar al feto hacia la cavidad abdominal creando espacio para corregir su mala posición; se hace mejor si la madre está parada y no en decúbito.

Rotación fetal. Maniobra que se justifica si el feto esta en posición dorsopúbica o dorsoiliaca.

Versión. Maniobra que combina tracción y repulsión; se aplica cuando la posición fetal es atípica. Este procedimiento es difícil en animales grandes.

Rectificación de extremidades. Corrección de posturas anormales, por lo común, debidas a flexiones de los miembros, de la cabeza o del cuello.

A

Bibliografía:

Enciclopedia bovina - distocia