



**NOMBRE DEL ALUMNO: BRENDA VIRIDIANA ROJAS
VAZQUEZ**

NOMBRE DEL TEMA: LAMINITIS Y PEDILUVIO

PARCIAL: 4 PARCIAL

**NOMBRE DE LA MATERIA: ZOOTECNIA DE OVINOS Y
CAPRINOS**

NOMBRE DEL PROFESOR: MEDICO SERGIO CHONG

**NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA
VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

CUATRIMESTRE: 7MO CUATRIMESTRE

LAMINITIS Y PEDILUVIO

QUE ES EL PEDILUVIO

El uso tópico de profilácticos como glutaraldehido, sulfato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de aluminio y sulfato de benzalconio, que desinfecten las pezuñas de los animales, siendo un biocida para evitar la colonización de las bacterias en la pezuña

TRATAMIENTO

por lo que se recomienda realizar un score de higiene patas y pezuñas del hato; en épocas de lluvia con pezuñas muy sucias es recomendable hacer uso del pediluvio al menos 3 ó 4 veces por semana con un cambio luego de cada 200 animales.

QUE ES

También llamada pododermatitis aséptica difusa; es considerada como una manifestación local de un trastorno de orden sistémico como factores nutricionales (exceso de granos en dieta), alteraciones posparto (mastitis, metritis), etc.

FASE AGUDA

En la fase aguda hay aumento de la tríada, anorexia, sudoración y la pezuña se encuentra caliente y dolorosa.

USO

La frecuencia de uso depende del grado de humedad a la que estén expuestas las pezuñas y la cantidad de barro que acumulen diariamente.



FASES

Presenta estadios agudos, subagudos y crónicos pudiendo afectar a todas las extremidades.

FASE SUBAGUDA

subaguda se aprecian petequias en la suela, mientras que en la crónica no hay síntomas generales pero presenta rigidez y cojera.

BIBLIOGRAFIA:

[HTTPS://WWW.GANADERIA.COM/DESTACADO/PODODERMATITIS-Y-EL-MANEJO-DE-LA-PREVENCION](https://www.ganaderia.com/destacado/pododermatitis-y-el-manejo-de-la-prevencion)