



UDS
Mi Universidad

UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DOCENTE
SERGIO JONG VELAZQUEZ


MATERIA
ZOOTECNIA DE OVINOS Y CAPRINOS

ALUMNO
CRISTIN YAHIR DIAZ MAZARIEGOS

GRADO
SISTEMA CUATRIMESTRE

TÍTULO
CUADRO SINÓPTICO

FECHA DE ENTREGA
01 DE DICIEMBRE DEL 2023



LAMINITIS

Es una

- Es una pododematitis aséptica difusa producida por la inflamación del corion o tejido sensitivo de la pezuña. En la mayoría de los casos, tiene un origen multifactorial pero, en terneros de cebo, está causada en un 90 % por un mal manejo alimentario.

Tratamiento

- El tratamiento se basa en la modificación de la dieta, antiinflamatorios, antibióticos, recorte de cascos y tratamiento de soporte.

LAMINITIS AGUDA

Cursa con un dolor muy intenso, rigidez y rechazo al movimiento. Los animales permanecen parados con la columna arqueada, tumbados mucho más tiempo y con los miembros posteriores separados. Tiene especial incidencia en animales jóvenes durante los primeros periodos de cebo.

LAMINITIS SUBAGUDA- CRÓNICA

Se produce fundamentalmente por la acidosis láctica subclínica y por el aumento de almidones que fermentan en el intestino grueso. En este no existe efecto tampón como en el rumen, no hay protozoos, el epitelio del ciego es una sola capa y, por tanto, la absorción de endotoxinas es mayor.



DEFINICIÓN

Es una pododermatitis purulenta, caracterizada por una intensa inflamación de toda la pezuña, con abundante secreción maloliente, de color gris plomo

PROVOCA
DESPRENDIMIENTO Y
PERDIDA DE PEZUÑA

- FORMACIÓN DE
• NECROSIS Y ÚLCERAS

AGENTES ETIOLÓGICOS

son un grupo de microorganismos de los cuales hay dos infaltables, que la caracterizan: Fusobacterium necrophorus y Bacteroides nodosus.

TRATAMIENTO LOCAL

- TRATAMIENTO PARENTERAL

SINTOMATOLOGÍA

El animal afectado lleva el miembro en el aire ya que el dolor es intenso. Son más frecuentemente afectados los miembros delanteros que los traseros, y en general se afecta un solo miembro.

DERMATITIS INTERDIGITAL NECROTICA

- SECRECIÓN AMARILLENTO

Bibliografía

<https://www.blog.consentidovacuno.es/posts/laminitis-principal-causa-de-cojera-distal-en-cebaderos.aspx>

[HTTPS://WWW.PRODUCCION-ANIMAL.COM.AR/SANIDAD_INTOXICACIONES_METABOLICOS/PATOLOGIAS_PEZUNAS/05-PIETIN_OVINO_CAPRINO.PDF](https://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/patologias_pezunas/05-pietin_ovino_caprino.pdf)