



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Deysi Guzmán Ávila

Nombre del tema: Placenta previa

Parcial: I

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: Cecilia De la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: 4

Placenta previa

Concepto

La placenta previa es un trastorno que se produce durante el embarazo en el que la placenta cubre total o parcialmente la abertura del útero (cuello del útero).

La placenta es un órgano que se desarrolla dentro del útero durante el embarazo. Su función es proporcionar oxígeno y nutrición al bebé y eliminar los desechos.

Etiología

La causa específica de la placenta previa es desconocida. Son factores favorecedores los siguientes:

- **Embarazo múltiple:** La placenta es de mayor tamaño, lo que aumenta el riesgo de que llegue a ser previa.
- **Cicatriz uterina anterior:** La incidencia crece con el número de cesáreas previas, dado que la placenta, al no poder anidar sobre la cicatriz, busca asiento en otras regiones, llegando hasta niveles más bajos de la cavidad uterina.
- **Multiparidad:** La paridad y la edad avanzada incrementan el riesgo de placenta previa, por un mecanismo similar al anterior.
- **Mujeres fumadoras:** Se duplica el riesgo probablemente porque la hipoxemia conlleva una hipertrofia placentaria compensadora.
- **Edad avanzada:** La incidencia es 5 veces mayor en mujeres con edad superior a 35

Clasificación

En este sentido, existen diferentes tipos de placenta previa

Placenta de inserción baja: La placenta se encuentra cerca de la abertura del cuello uterino, en un lateral, pero no lo cubre.

Placenta previa marginal: La placenta está en uno de los bordes del orificio del cuello uterino, pero tampoco lo cubre.

Placenta previa parcial: La placenta obstruye parte de la abertura cervical.

Placenta previa total: la placenta cubre toda la abertura cervical, lo que impide la salida del feto en un parto natural.

Placenta previa

Cuadro clínico

El cuadro clínico para diagnosticar placenta previa es la hemorragia indolora que se presenta al final del segundo trimestre de gestación o al inicio del tercer trimestre, rara vez presentan hemorragia dolorosa probablemente se dé por contracciones uterinas o separación placentaria. La ecografía abdominal y transvaginal también son un medio diagnóstico para placenta previa

Diagnostico

La placenta previa se diagnostica mediante una ecografía, ya sea durante una cita médica prenatal de rutina o después de un episodio de sangrado vaginal. La mayoría de los casos de placenta previa se diagnostican durante una ecografía en el segundo trimestre.

El diagnóstico inicial puede hacerse con un dispositivo de ecografía sobre el abdomen. Es posible que para obtener imágenes más precisas necesites una ecografía transvaginal, en la que se utiliza un dispositivo con forma de varilla que se coloca dentro de la vagina. El proveedor de atención médica tendrá cuidado con la posición del dispositivo para no romper la placenta ni causar sangrado.

Tratamiento

El tratamiento de la placenta previa depende de algunos factores, siendo los más importantes:

- Si la paciente tiene una hemorragia abundante o en gran frecuencia.
- La edad gestacional.
- El tipo de placenta previa.

❖ Mujeres embarazadas asintomáticas o con sangrado discreto:

Se indica la abstención sexual y reposo. El parto generalmente es inducido en la 37^a semana. La vía del parto depende del tipo de placenta previa. Placenta previa completa o placenta con obstrucción incompleta, pero cuyo borde es inferior a 2 cm del orificio de salida del cuello uterino, son indicaciones de cesárea.

❖ Mujeres embarazadas con sangrado vaginal moderado a grande

La mujer embarazada debe ser hospitalizada y tratada con transfusiones de sangre. Si el embarazo ya tiene 36 semanas, se realiza una cesárea.

Si el embarazo tiene menos de 35 semanas, el tratamiento inicial es generalmente conservador, con interrupción del embarazo por cesárea solamente si el sangrado no para o si el bebé comienza a presentar signos de sufrimiento.

Placenta previa

Complicación

Si tienes placenta previa, el proveedor de atención médica te supervisará a ti y a tu bebé para reducir el riesgo de estas complicaciones graves:

- ❖ Sangrado. Durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto o las primeras horas después de dar a luz puede presentarse un sangrado (hemorragia) vaginal intenso que puede poner en riesgo la vida.
- ❖ Nacimiento prematuro. El sangrado intenso puede dar lugar a una cesárea de emergencia antes de que tu embarazo haya llegado a término.
- ❖ Espectro de placenta acreta. La placenta previa está asociada a un grupo de afecciones denominadas espectro de placenta acreta. En estas afecciones, la placenta crece dentro o a través de la pared del útero. La placenta acreta tiene un alto riesgo de sangrado durante el embarazo o durante y después del parto.

Prevención

Para evitar la placenta previa o placenta baja existen una serie de medidas que pueden ayudarte. Aunque no se han establecido unas pautas reconocidas o refutadas muchos médicos aconsejan para la prevención de la placenta previa:

- ❖ Espaciar los embarazos entre sí
- ❖ Evitar los embarazos a edades avanzadas, ya que el cuerpo de la mujer ya no está tan preparado como cuando es mucho más joven.
- ❖ Los embarazos gemelares o múltiples suelen suponer una serie de riesgos y cuidados específicos que pasan por la prevención de la placenta baja
- ❖ Evitar todo tipo de intervenciones innecesarias que puedan alterar las capas uterinas.
- ❖ Eliminar el tabaco y las drogas totalmente.
- ❖ Evitar todo tipo de intervenciones innecesarias que puedan alterar las capas uterinas.
- ❖ Eliminar el tabaco y las drogas totalmente.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/placenta-previa/symptoms-causes/syc-20352768>
2. <https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/urgencias-de-obstetricia/emergencias-urgencias-de-obstetricia/placenta-previa/>
3. <https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/urgencias-de-obstetricia/emergencias-urgencias-de-obstetricia/placenta-previa/>
4. [https://revistamedica.com/proceso-de-atencion-de-enfermeria-placenta-previa/#:~:text=El%20cuadro%20cl%C3%ADnico%20para%20diagnosticar%20placenta%20previa%](https://revistamedica.com/proceso-de-atencion-de-enfermeria-placenta-previa/#:~:text=El%20cuadro%20cl%C3%ADnico%20para%20diagnosticar%20placenta%20previa%20)
5. <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/placenta-previa/diagnosis-treatment/drc-20352773>
6. <https://www.mdsau.de.com/es/embarazo/placenta-previa-es>
7. <https://elembarazo.net/como-prevenir-la-placenta-previa-en-el-embarazo.html>