



Nombre del Alumno: José Raúl Jiménez pinto

Nombre del tema: Placenta Previa

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

## Placenta previa

En los casos de placenta previa, la placenta se une a la parte inferior del útero. Como consecuencia, una parte de los tejidos placentarios cubren el cuello del útero. Esto puede generar sangrado durante el embarazo o durante o después del parto.

En los casos de placenta previa, la placenta se une a la parte inferior del útero. La placenta podría cubrir de manera parcial o total la abertura del útero, que se denomina cuello del útero. La placenta previa puede causar sangrado intenso en la madre antes, durante o después del parto.

Durante el embarazo, la placenta se desplaza a medida que el útero se estira y crece. Al inicio del embarazo, es muy común que la placenta esté en la parte baja del útero. Pero a medida que el embarazo avanza, la placenta se desplaza hacia la parte superior de este. Hacia el tercer trimestre, la placenta debe estar cerca de la parte superior del útero, de manera que el cuello uterino esté despejado para el parto.

- Multiparidad
- Cesárea previa
- Anomalías uterinas que inhiben la implantación normal (p. ej., miomas, legrado previo)
- Cirugía o procedimiento uterino previo (p. ej., miomectomía) (p. ej., múltiples procedimientos de dilatación y legrado [D y L])
- Tabaquismo



El síntoma principal de la placenta previa es un sangrado vaginal súbito. Algunas mujeres también presentan cólicos. El sangrado a menudo comienza cerca del final del segundo trimestre o empezando el tercer trimestre.

El sangrado puede ser intenso y potencialmente mortal. Puede detenerse por sí solo, pero puede empezar de nuevo días o semanas después.

El trabajo de parto algunas veces empieza al cabo de varios días después del sangrado abundante. Algunas veces, es posible que el sangrado no ocurra hasta después del comienzo del trabajo de parto.

## Enlaces

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mayoclinic.org%2Fes%2Fdiseases-conditions%2Fplacenta-previa%2Fsymptoms-causes%2Fsymptoms-causes&psig=AOvVaw3cx4FhULSYc9DHO6pBSQ1k&ust=1701277716621000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBMQjhxqFwoTCIjJ-8GX54IDFQAAAAAdAAAAABAE>

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmy.clevelandclinic.org%2Fhealth%2Fdiseases%2F24211-placenta-previa&psig=AOvVaw3cx4FhULSYc9DHO6pBSQ1k&ust=1701277716621000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwi0jP3AI-eCAxWS3MkDHfKPB9AQr4kDegQIARBc>

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.reproducconasistida.org%2Fque-es-la-placenta-previa&psig=AOvVaw3cx4FhULSYc9DHO6pBSQ1k&ust=1701277716621000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwi0jP3AI-eCAxWS3MkDHfKPB9AQr4kDegQIARBa>