



Mi Universidad

Nombre del Alumno: fernanda cruz perez

Nombre del tema : PLACENTA PREVIA.

Nombre de la Materia :ENFERMERIA EN EL
CUIDADO DE LA MUJER

Nombre del profesor:CECILIA DE LA CRUZ
SANCHEZ

Nombre de la Licenciatura : enfermeria

Cuatrimestre: 4

PLACENTA PREVIA.

Placenta previa

- La placenta es un órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo. En la mayoría de los embarazos, la placenta se une a la parte superior o lateral del útero. En los casos de placenta previa, la placenta se une a la parte inferior del útero. La placenta podría cubrir de manera parcial o total la abertura del útero, que se denomina cuello del útero. La placenta previa puede causar sangrado intenso en la madre antes, durante o después del parto.

Síntomas

El síntoma principal de la placenta previa es un sangrado vaginal de color rojo brillante, generalmente indoloro, después de 20 semanas de embarazo. A veces, las manchas de sangre aparecen antes de un evento con más pérdida de sangre.

Cuándo consultar al médico

Si tienes sangrado vaginal durante el segundo o el tercer trimestre, llama al proveedor de atención médica de inmediato. Si el sangrado es intenso, busca atención médica de emergencia.

PLACENTA PREVIA.

Causas

Se desconoce la causa exacta de la placenta previa.

Factores de riesgo

Tuvieron hijos
Tuvieron un parto por cesárea anteriormente
Tienen cicatrices en el útero como consecuencia de una cirugía o un procedimiento anterior
Tuvieron placenta previa en un embarazo anterior
Están embarazadas tras someterse a un procedimiento de reproducción asistida para tratar la infertilidad
Están gestando más de un feto
Tienen más de 35 años
Fuman
Consumen cocaína

Complicaciones

Sangrado.

Nacimiento prematuro.

Espectro de placenta acreta.