

Nombre del Alumno:alejandra cruz perez

Nombre del tema: PLACENTA PREVIA

Parcial: 2

Nombre de la Materia : Nombre del

profesor: CECILIA DE LA CRUZ

SANCHEZ

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

placenta previa

La placenta previa es una causa de sangrado en un embarazo avanzado. Esto quiere decir después de las 20 semanas aproximadamente. La placenta previa causa sangrado porque la placenta está cerca del cuello uterino o lo cubre. El sangrado debido a placenta previa no causa dolor



En los casos de placenta previa, la placenta se une a la parte inferior del útero. La placenta podría cubrir de manera parcial o total la abertura del útero, que se denomina cuello del útero. La placenta previa puede causar sangrado intenso en la madre antes, durante o después del parto.



Si se trata de una placenta previa completa o parcial, pero con un borde inferior a 2 cm del orificio de salida del cérvix, la vía de parto será necesariamente una cesárea. Por otra parte, si el borde de la placenta se encuentra a más de 2 cm del orificio de salida del cérvix, es posible tener un parto vaginal



placenta previa

La placenta previa es un trastorno que ocurre durante el embarazo y que se caracteriza por la presencia de tejido placentario cerca o cubriendo el cuello uterino. El mayor riesgo de placenta previa es el sangrado . El sangrado a menudo ocurre cuando la parte inferior del útero comienza a estirarse y alargarse en preparación para el parto.



¿Puede la placenta previa causar defectos de nacimiento? Es poco común que la placenta previa cause defectos de nacimiento . Su bebé puede nacer prematuro si su proveedor de atención médica considera que es el momento más seguro para dar a luz. El nacimiento prematuro conlleva algunas complicaciones, como bajo peso al nacer y problemas respiratorios.



Mayor riesgo de muerte: si su progenitor gestacional tiene placenta previa, los bebés corren riesgo de muerte perinatal o neonatal (natalidad fetal o muerte en el primer mes de vida). Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU): un suministro deficiente de sangre placentaria puede limitar el crecimiento del feto, lo que a su vez puede causar problemas de salud.



INFOGRAFÍA



Placenta previa-Placenta previa -Síntomas y causas

Infórmate sobre cómo se diagnostica y se controla esta complicación del...



Mayo Clinic