



Mi Universidad

Infografía

Nombre del Alumno: Mariam de los ángeles Martínez Villagrán

Nombre del tema: TCA en adolescentes

Parcial: 4

Nombre de la Materia: nutrición en actividades pediátricas


Nombre del profesor: Italia Yamilet Hernández Figueroa

Nombre de la Licenciatura: en nutrición

Cuatrimestre: 7

Lugar y fecha: Tapachula Chiapas 02/12/23

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN ADOLESCENTES



ANOREXIA NERVIOSA

se caracteriza por la restricción de la ingesta en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Las personas con este trastorno tienen un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obesos, incluso estando por debajo del peso normal


BULIMIA NERVIOSA

Se caracteriza por la existencia de episodios recurrentes de atracones. Se considera como atracón a la ingesta de una cantidad de comida claramente superior a la que la mayoría de la gente puede tomar en un periodo determinado de tiempo (de aproximadamente dos horas), acompañada de la sensación de pérdida de control durante este episodio



TRASTORNOS POR ATRACONES

se caracteriza por episodios recurrentes de atracones. Estos se pueden asociar a comer mucho más rápido de lo normal, seguir comiendo a pesar de sentirse desagradablemente lleno, comer una gran cantidad de comida, a pesar de no tener sensación de hambre, y sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o con sensación de gran culpabilidad tras el episodio



TRASTORNO EVITATIVO/RESTRICTIVO DE LA INGESTA ALIMENTARIA

caracteriza por una falta de interés en la comida o por la evitación a causa de alguna de las propiedades sensoriales de la comida o por una preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer o un miedo al atragantamiento, manifestando una incapacidad persistente para satisfacer las necesidades nutricionales.

