Cuadro sinóptico

NOMBRE DEL ALUMNO : Pablo jafet Davila covian

TEMA:procedimientos relacionados con vía venosa central y periférica

PARCIAL: I

MATERIA: practica clínica de enfermería II

NOMBRE DEL PROFESOR:Lic Rebeca Marili Vázquez

LICENCIATURA:Enfermería

CUATRIMESTRE:7to cuatrimestre

Catéter venoso central y catéter venoso periférico

Catéter venoso central c.v.c

- ¿Que es ?
  - Tubo delgado y flexible mejor conocido como sonda que es introducido en una vena por lo general por debajo de la clavícula derecha y se pasa hasta la vena cava superior vena grande alado derecho del corazón
- ¿Sus partes cuáles son?
  - Catéter venoso central, clamp, lumen, y conector sin aguja.

Uso correcto de los puertos o lumenes.

- Proximal:
  - Medicación y sedo analgesia
    Toma de muestras
    Transfusion de sangre y hemoderivados.
- Distal:
  - Medicion presión venosa central(PVC)
    Fluido terapia grandes volúmenes fluidos viscosos coloides.
    Medicación
    Transfusión de sangre y hemoderivados
- Medial:
  - Nutrición parenteral(NTP) está debe ser exclusiva
    Si no hay NTP se puede usar para medicación .

Cómo elegir el catéter adecuado

- ¿Por que ?
  - Se debe elegir el catéter adecuado para prevenir complicaciones como la flebitis.
  - Si el tratamiento dura 6 días se debe. De utilizar un catéter corto , según el tratamiento elige el catéter adecuado .
- Su función de los catéter por número :
  - 14 y 16. Estos de usan en quirófanos emergencias y transfusiones de sangre .
    18 se usa para nutrición parenteral periférica transfusiónes y grandes volúmenes de fluidos.
    20 medicaciones transfusiones y grandes volúmenes de fluidos.
    22 medicaciones transfuciones y fluidos.
    24se usa en infuciones de corta duración geriatría pediatra y neonatos.

Manejo de la nutrición parenteral

- Como administrar nutrición parenteral correctamente:
  - Es un soporte nutricional terapéutico a través de un procedimiento invasivo a través del cual se administran nutrientes de forma directa en el organismo por vía endovenosa y sin necesidad de paso digestivo y hepatico.
  - Nutrición parenteral total o central cuando se aportan todas las necesidades nutricionales del organismo.
  - Administración por vía endovenosa :vía central , vía periférica , intradialisis peritoneal, y fístula arteriovenosa. Se usará una vía central de inserción periférica cuando la concentración de glucosa sea mayor del 10 porciento .
  - Nutrición parenteral perifierica. Si no se sobrepasan los 800 moscas/Ly estos pueden ser aportados a través de una vena media como la basílica.
- La nutrición parenteral:
  - Se usa en personas que no pueden cubrir sus necesidades nutricionales por la vía digestiva para prevenir o tratar la desnutrición.
  - Recomendaciones:controlar las constantes vitales de los pacientes con nutrición parenteral.
    No inyectar transfusiones de sangre al mismo tiempo que una solución de nutrición parenteral.
    Usar un único puerto exclusivo para la nutrición parenteral .
    Los equipos de administración se deben cambiar de forma aséptica cada 24 horas.
    No se debe acelerar la infusión aun que se halla retrasado.