



Karina Mendoza Cruz

Lic. Stefany Hernández Cruz

Practica clínica de enfermería II

Cuadro Sinóptico

Bibliografía Antología

07/11/23

Paciente con dengue

fases de la enfermedad

- Fase febril
- Fase crítica
- Fase de recuperación.

Definición.

es una infección vírica que se transmite de mosquitos a personas.

Diagnostico

Caso sospechoso de Dengue: presenta Fiebre de menos de 7 días de duración

Caso probable de Dengue: cefalea, • dolor retro-orbitario, • mialgia.

Caso confirmado de Dengue: Por laboratorio.

fase febril

Es de inicio brusco.

- Usualmente dura 2-7 días.
- Se acompaña de enrojecimiento facial, eritema generalizado, mialgias difusas, artralgias, cefalea. Algunos pacientes tienen dolor y enrojecimiento faríngeo.
- Son comunes las náuseas, vómitos y a veces diarreas.

fase critica

- Coincidiendo con el momento de la defervescencia, que ocurre ente los días 3 - 7 de la enfermedad, (cuando la temperatura cae a 37.5-38°C o menos, y permanece en esos niveles), puede.
- Un signo precoz del escape importante de líquidos es la disminución de la presión de pulso.
- El escape de líquido dura aproximadamente 24-48 h. U

fase de recuperación

- En los pacientes con signos de alarma o dengue grave que sobreviven tras las 24-48 h.

tratamiento

anamnesis general.

síntomas

- fiebre elevada (40 °C/104 °F)
- dolor de cabeza muy intenso
- dolor detrás de los ojos
- dolores musculares y articulares
- náuseas
- vómitos
- agrandamiento de ganglios linfáticos
- sarpullido

Transmisión

El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas, principalmente del mosquito *Aedes aegypti*.