



CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: Anayely de la cruz arias

Nombre del tema: Asistencia y cuidados de enfermería durante el parto

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: Lic. Alfonso Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

ASISTENCIA Y CUIDADOS DE ENFERMERIA DURANTE EL PARTO

Periodos de trabajo de parto

Primera etapa: periodo de dilatación (o trabajo de parto). Cuenta con dos fases, inicial y activa.

Segunda etapa: periodo de expulsión. Se trata del nacimiento del bebé.

Tercera etapa: periodo de alumbramiento. Se trata de la expulsión de la placenta.

Durante el trabajo de parto temprano: La abertura del útero, llamada cuello uterino, comienza a afinarse y ensancharse, o dilatarse. Las contracciones se hacen más fuertes, duran de 30 a 60 segundos y se producen cada 5 a 20 minutos.

Durante el trabajo de parto activo: Las contracciones se vuelven más fuertes, más largas y más dolorosas. Las contracciones se hacen cada vez más frecuentes, por lo que es posible que la mujer tenga tiempo para relajarse entre cada contracción.

Durante la etapa 2: La mujer puede sentir presión en el recto a medida que la cabeza del bebé se mueva a través de la vagina.

Durante la etapa 3: Las contracciones comienzan de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. La mujer puede tener escalofríos o sentirse temblorosa.

Parto vaginal

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia define el parto vaginal normal como el trabajo de parto en una embarazada sin factores de riesgo durante la gestación, que se inicia de forma espontánea entre las semanas 37 y 42...

El parto vaginal normal es el único tipo de parto que se puede atender sin intervención médica, es decir, realizando el menor número posible de procedimientos activos, sin olvidar nunca la vigilancia exhaustiva del estado de la madre y del feto.

Un parto vaginal puede durar desde días a semanas e incluso de minutos a horas; en general La mayoría de los partos vaginales suelen llevarse a cabo sin problemas, pero en algunos casos el bebé puede quedar atascado en el canal del parto, dura más tiempo con el primer hijo.

Tipos de partos:
Parto natural.
Parto en el agua o hidroparto.

Parto abdominal

Cesárea

Es el parto de un bebé en el que se hace una abertura en la zona baja del vientre de la madre.

Descripción

Un parto por cesárea se realiza cuando no es posible o seguro para la madre dar a luz al bebé a través de la vagina.

El procedimiento generalmente se hace mientras la mujer está despierta. El cuerpo está anestesiado desde el tórax hasta los pies, usando anestesia epidural o raquídea.

1. El cirujano hace una incisión a través del abdomen justo por encima del área púbica.
2. Se abre el útero (matriz) y el saco amniótico.
3. Se saca al bebé a través de esta abertura.

La cirugía demora aproximadamente 1 hora

Se hace una doble incisión: una en el abdomen (laparotomía) y otra en la pared del útero (histerotomía). Por lo general la incisión de la cesárea se realiza en horizontal por encima del pubis.