



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Ronaldo De La Cruz

Nombre del tema: Tipos de shock

Nombre de la Materia: practica clínica de enfermería II

Nombre del profesor: Mariano Walberto Balcázar Velasco

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7To A

SHOCK NEUROGÉNICO

El shock neurogénico que es causado por daño al sistema nervioso.

TRATAMIENTO

- Respirador (ventilación mecánica)
- Diálisis
- Medicamentos para tratar la presión arterial baja, la infección o la coagulación de la sangre
- Alto volumen de líquidos administrados directamente en la vena (por vía intravenosa)
- Oxígeno
- Sedantes
- Cirugía para drenar las zonas infectadas, en caso de ser necesario
- Antibióticos u otros agentes para tratar infecciones virales o por hongos

SÍNTOMAS

- Confusión o falta de lucidez mental
- Pérdida de la conciencia
- Latidos del corazón rápidos y de forma repentina
- Transpiración
- Palidez
- Pulso débil
- Respiración acelerada
- Reducción del flujo o detención total de orina
- Pies y manos frías

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control de la vía aérea.
- Apertura vía aérea.
- Administración de O₂, según prescripción médica
- Monitorización de saturación de O₂, E.K.G., P.A., (si está indicado)
- Tomar constantes vitales. P⁰, T^a, T.A., F.R.-
- Canalizar vía venosa central
- Instalar sistema de medición de P.V.C
- Instalación de sonda vesical

SHOCK SEPTICO

Es una afección grave que se produce cuando una infección en todo el cuerpo lleva a que se presente presión arterial baja peligrosa.

TRATAMIENTO

- Respirador (ventilación mecánica)
- Diálisis.
- Medicamentos para tratar la presión arterial baja, la infección o la coagulación de la sangre.
- Alto volumen de líquidos administrados directamente en la vena (por vía intravenosa)
- Oxígeno.
- Sedantes.
- Cirugía para drenar las zonas infectadas, en caso de ser necesario.

SÍNTOMAS

- Brazos y piernas fríos y pálidos.
- Temperatura alta o muy baja, escalofríos.
- Sensación de mareo.
- Disminución o ausencia del gasto urinario.
- Presión arterial baja, en especial al estar parado.
- Palpitaciones.
- Frecuencia cardíaca rápida.
- Inquietud, agitación, letargo o confusión.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Canalizar catéter arterial para control de TA y control analítico.
- Canalizar al menos 2 vías venosas periféricas de grueso calibre para administración de tratamiento.
- Administrar volumen para restablecer volemia y TA.
- Administrar antibiótico de amplio espectro hasta recibir resultados de cultivos.
- Cuando la glucemia está elevada se administrará insulina rápida, realizándose controles cada 1 o 2 horas.

SHOCK ANAFILÁCTICO

La reacción puede ocurrir segundos o minutos después de la exposición a un agente alérgeno.

SÍNTOMAS

- Los síntomas incluyen erupción cutánea
- Náuseas
- vómitos
- dificultad para respirar
- shock.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Colocar al paciente en posición de seguridad: o Decúbito supino o Si hay hipotensión, se elevarán las extremidades inferiores o Si vomita, se le colocará con la cabeza de lado
- Asegurarse de que la vía aérea esté libre (dentadura postiza, vómitos, etc), si no es así,
- liberarla.

TRATAMIENTO

- Epinefrina (adrenalina) para reducir la respuesta alérgica del organismo.
- Oxígeno, para ayudarte a respirar.
- Antihistamínicos y cortisona intravenosos para reducir la inflamación de las vías respiratorias y mejorar la respiración.
- Un agonista beta (como el albuterol) para aliviar los síntomas respiratorios.

SHOCK HIPOVOLÉMICO

TRATAMIENTO

Se coloca una vía intravenosa en el brazo de la persona para permitir la administración de sangre, productos sanguíneos o líquidos. Medicamentos como la epinefrina o norepinefrina pueden ser necesarios para incrementar la presión arterial y la cantidad de sangre bombeada del corazón (gasto cardíaco).

Que es

Un shock hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar.

SÍNTOMAS

- Ansiedad o agitación.
- Piel fría y pegajosa.
- Confusión.
- Disminución o ausencia de gasto urinario.
- Debilidad generalizada.
- Piel de color pálido (palidez)
- Respiración rápida.
- Sudoración, piel húmeda.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Mantener vía aérea impermeable
- Administrar oxigenación de acuerdo a lo que le medico indique
- Controlar y valorar los signos vitales
- Prevenir complicaciones

SHOCK CARDIOGENO

Ocurre cuando el corazón ha resultado tan dañado que es incapaz de suministrarles suficiente sangre y oxígeno a los órganos del cuerpo.

TRATAMIENTO

- Dobutamina
- Dopamina
- Epinefrina
- Levosimendán
- Norepinefrina
- Vasopresina
- Estos medicamentos pueden ayudar a corto plazo y no se usan por mucho tiempo.

SÍNTOMAS

- Dolor o presión en el tórax
- Coma
- Disminución de la orina
- Respiración acelerada
- Pulso rápido
- Piel húmeda
- Mareo
- Pérdida de la lucidez mental

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Valoración del estado de la conciencia
- Monitorización de signos vitales
- Obtención de más de una vía venosa
- Transfusiones sanguíneas
- Intervenciones específicas para la causa
- Preparar goteo de vasopresores
- Monitorización continua de TAM