



**Nombre de alumno: Adrián Vega  
Sánchez**

**Nombre del profesor: Carlos Alberto  
Trujillo Diaz**

**Nombre del trabajo: Cuadro  
comparativo**

**Materia: Introducción a la Historia de la  
Medicina Veterinaria y Zootecnia**

**Grado: 1°**

**Grupo: Medicina en Veterinaria y  
Zootecnia**

<b>TIPO DE VACA</b>	<b>CARNICO</b>	<b>LECHERA</b>	<b>DOBLE PROPSITO</b>
<b>PRODUCTO GENERADO</b>	Carne	Leche	Leche y carne
<b>COMPLEXIÓN</b>	Delgada y de ubres amplias. Vistas desde el glúteo de forma caudal hacia el cráneo forma un triángulo, agregando que visto desde un lado la misma tendrá forma de un triángulo escaleno que se hará más en cuanto llegue la cabeza.	Tienden a ser de una morfología más robusta y macizas, con huesos grandes. Y de igual manera, si observamos de la parte caudal del glúteo al cráneo del individuo, este tendrá una forma rectangular.	Posee características de las dos variantes que fueron anteriormente mencionadas
<b>ALCANZE DE LA PUBERTAD</b>	10 a 11 meses	12 a 13 meses	12 meses
<b>EDAD Y PESO PARA EL APAREAMIENTO</b>	15 meses y oscilar entre 300 a 320 kilogramos o el equivalente del 55 por ciento del pesaje de la madre	15 meses y oscilar entre 300 a 320 kilogramos o el equivalente del 55 por ciento del pesaje de la madre	15 meses y oscilar entre 300 a 320 kilogramos o el equivalente del 55 por ciento del pesaje de la madre
<b>SISTEMAS</b>	Sistemas de engorda intensiva que se desarrollan en un plazo máximo de 6 meses	Una vez que alcanzan la madurez sexual, son inducidas a protocolos de inseminación, con el fin de obtener el producto requerido. Una vez que la madre paría a la cría, esta se mantiene en un cierto periodo con la misma con el fin de tener la mayor producción posible de leche. Consecuentemente, la cría llegada a una edad a la cual deja la madre, y a la susodicha se le deja en un intervalo de descanso que abarca desde los 12 hasta los 13 meses.	Entra en un proceso en el cual, se utiliza a la madre primeramente como lechera en un plazo máximo de dos años, en donde dichos años no se desgasta ni se mantiene tanto tiempo la cría junto a la madre con el fin de que no pierda valores nutrimentales la anteriormente mencionada. Tras los dos años de servicio es trasladada al matadero.