



**Nombre de alumno: Anahí Jihovana
López Encinos**

**Nombre del profesor: Ámbar Jaquelin
cansino Alcázar**

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Materia: Urgencias y Desastres

Grado: 7

Grupo: Lic Enfermería

TIPOS DE SHOCK EN CUIDADOS DE ENFERMERIA

SHOCK SEPTICO

para brindar el cuidado de enfermería al paciente con shock que CAUSA con un estado crítico de salud y se encuentra hospitalizado.

- valorar el estado del paciente
- valorar el estado de conciencia del paciente.
- valorar las esturas corporales.

causa alteraciones en la perfusión y flujo sanguíneo cerebral.

SHOCK HIPOVOLEMICO

• pérdida grave de sangre o líquido, hace que el corazón sea incapaz de bombear la sangre al cuerpo.

- Signos y síntomas
 - pulso débil y rápido
 - palidez y frialdad de la piel
 - Mareo y fatiga

Clasificación:

- pérdidas externas
- pérdidas intestinales
- Embarazo alteraciones en la coagulación

SHOCK ANAFILACTICO

La anafilaxia o choque anafiláctico, es una reacción aguda potencialmente letal, que es causada por la liberación masiva.

Precauciones: Colocar al paciente en posición de seguridad, o decubito supino o si hay hipotensión, se elevan las extremidades inferiores.

- Equipo: Fonendo correa
- Esfigmomanómetro
 - Guantes esteriles
 - camilla articulada
 - Torniquetes

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON TCE

Es un movimiento repentino de la cabeza y el cerebro puede aser que el cerebro puede rebotar o se retuerze el craneo lesionando las celulas cerebrales.

- valoración del nivel de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow.

Enfermería sera la encargada de realizar determinaciones de clima cada 6 horas.

El paciente debe presentar una correcta eliminacion corporal y permanecer siempre con la cabeza en posicion neutra, evitando la rotacion.

La noradrenalina es un farmaco que no esta exento de riesgos a la hora de manejarlo. En nuestra unidad, Teniendo en cuenta los Principios de Seguridad.