

UOS

Licenciatura en Enfermería.

Docente: Ámbar Jaqueline Alcazar Cancino.

Alumna: Sayiko Montserrat Luno Gómez.

Materia: Enfermería Clínica I

Actividad: Mapa conceptual / Úlceras por Presión.

Grado: 4to semestre.

Grupo: Enfermería.

25/ septiembre/ 2023.



# Úlceras Por Presión

De origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea.

Producida Por.

- Presión o Fricción entre dos Planos duros.  
- Problema grave en personas de edad avanzada.

De aumento vascular. Combina los efectos de Presión y Fricción.

**Fricción.**  
• Actúa Perpendicularmente a la Piel, Produciendo:  
- Rozes por maullamiento o arrastre.  
- La humedad aumenta la fricción al estar de mayor la piel.

**Presión.**  
Fuerza ejercida a la piel debido a la gravedad provocando:  
- Aproximamiento tisular.  
- Ocurre el flujo sanguíneo con posterior a hipoxia en los tejidos.

Mecanismos de Producción

Factores de Riesgo

1. **Fisiopatológicos**  
• Lesiones cutáneas (quemaduras y patológicas)  
• Trastornos del transporte de oxígeno (Anemias, cardiopatías)  
• Déficit nutricionales.  
• Trastornos inmunológicos.  
• Déficit sensoriales.

4. **Del entorno.**  
• Falta o mala utilización del material de prevención.  
• Sobre carga de trabajo.  
• Deterioro de la propia imagen de la enfermedad.  
• Falta de educación sanitaria en el ámbito.

2. **Debidos por Inmovilidad.**  
• Inmovilidad involuntaria (debido a la edad).  
• Sondajes con fines diagnósticos o tratamiento.

3. **Situacionales.**  
• Falta de higiene.  
• Arrugas en la ropa.  
• Objetos de roce.  
• Inmovilidad por dolor.  
• Fatiga.

Prevención

**Cuidados de la Piel:**  
- Inspección de la piel.  
- Limpiar la piel.  
- Cambios de posición.  
- Tratar la piel seca con agentes hidratantes.  
- Tratar la desnutrición y mejorar la movilidad.

Clasificación

**Estadio I**  
• Eritema cutáneo que no persiste al observar.  
• Edema.  
• Induración de coloración.  
• Color local.

**Estadio II**  
• Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla, pérdida de piel que involucra la epidermis, de más o menos.


**Estadio IV**  
• Pérdido total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo hueso.  
• Infección de sostén.

**Estadio III**  
• Pérdido total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo.

Localización.

• Trocánteros.  
• Sacro.  
• Glúteos.  
• Talones.







Origen isquémico, localizada en la piel y tejidos adyacentes con pérdida de sustancia dérmica.

Producida Por.

Presión o fricción entre dos planos duros. Problema grave en personas de edad avanzada.

# Úlceras Por Presión

Mecanismos de Producción

**Presión**  
Fuerza ejercida a la piel debido a la gravedad provocando:  
- Aparentamiento isular  
- Ocluye el flujo sanguíneo con posterior a hipoxia en los tejidos.

**Fricción**  
Actúa patológicamente a la piel, produciendo:  
- Rozes por movimiento o arrastre  
- La humedad aumenta la fricción sobre la piel.

De Anzamiento Vascular. Combina los efectos de Presión y Fricción.

Factores de Riesgo

**1. Fisiopatológicos**  
• Lesiones cutáneas (envejecimiento y patológicas)  
• Trastornos del transporte de oxígeno (trastornos cardio vasculares)  
• Déficit nutricionales.  
• Trastornos inmunológicos  
• Déficit sensoriales

Localización.

- Trocánteres
- Sacro
- Glúteos.
- Talones.

**2. Derivados del Tratamiento**  
• Inmovilidad inactiva por tratamiento  
• Tratamiento invasivo (catéteres)  
• Sondajes con fines diagnósticos o tratamiento

**4. Del entorno.**  
• Falta o mala utilización del material de prevención.  
• Sobre carga de trabajo.  
• Deterioro de la propia imagen de la enfermedad.  
• Falta de educación sanitaria en pacientes

**3. Situaciones**  
• Falta de higiene  
• Arrugas en la ropa.  
• Objetos de roce.  
• Inmovilidad por dolor.  
• Fatiga.



De origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea.

Producida Por.

- Presión o Fricción entre dos Planos duros.
- Problema grave en personas de edad avanzada.

# Úlceras Por Presión

Prevención

- Cuidados de la Piel:
- Inspección de la piel
  - Limpiar la piel
  - Cambios de posición
  - Tratar la piel seca con agentes hidratantes
  - Tratar la desnutrición y mejorar la movilidad.

Clasificación

Localización.

- Trocánteres
- Sacro
- Glúteos.
- Talones.

- Estadio I
- Eritema cutáneo que no palidece. Observar
- Edema
  - Induración de coloración
  - Color local.

- Estadio II
- Úlceras superficiales que tienen aspecto de abolladura, ampolla, pérdida de piel que involucra la
- Epidermis, dermis o ambas.

- Estadio IV
- Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en
- músculo
  - hueso
  - Estructura de sostén

- Estadio III
- Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo.