



Nombre: Aracely Gómez López.

Docente: Ámbar Jaqueline Alcázar Cancino.

Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer.

Trabajo: Mapa conceptual.

Tema: Trabajo del parto.

Cuarto Cuatrimestre.

Trabajo de parto

Las 4 p del nacimiento.

Pasaje pelvis: atravesará el feto en particular durante el parto.

Pasajero: el feto debe encontrarse en posición favorecedora para su expulsión.

Poder o intensidad, las contracciones uterina debe ser rítmicas, coordinadas y eficaces.

Psique: Los esfuerzos maternos tienen que ser adecuados para conseguir la expulsión del feto.

Trabajo de parto.

Primera etapa: se inicia al empezar las contracciones uterina regulares y termina con la dilatación completa del cuello uterino.

Segunda etapa: comienza con la dilatación completa del cuello uterina y termina al nacer el feto.

Tercera etapa: empieza con el nacimiento del feto y termina al expulsar la placenta.

Cuarta etapa: se inicia con la exposición de la placenta y dura por lo menos una hora o hasta que se normaliza el estado de la mamá.

Episiotomía.

Poder o intensidad: el útero en el trabajo de parto.

La intensidad de las contracciones uterina es la fuerza de mayor importancia que contribuye al proceso de trabajo de parto y de nacimiento.

Relaciones feto pélvicas es para describir la posición del feto en la pelvis y su nivel de descenso.

Factores que influyen en la evolución del trabajo de parto.

Edad materna, peso materna, intervalo de nacimiento, peso al nacer, posición fetal, estado del saco amniótico, sitio de implantación de la placenta y posición de la madre durante el parto.

Dolor del parto.

Muchas mujeres esperan y en realidad presentan cierto grado de dolor durante el nacimiento de sus hijos.

Intervalos de las contracciones uterinas.

En el trabajo de parto normal, las contracciones se producen a intervalos de 2 a 20 minutos con una duración de 15 a 19 segundos.

Es la incisión que se realiza durante la segunda etapa del trabajo de parto para ampliar la abertura y dar paso a la cabeza del feto.

Desgarros del periné y la vaina.

Durante el nacimiento pueden producirse desgarros espontáneos del periné la vaina y ocasionalmente, el cuello uterino.

Intervenciones de enfermería.

La asistencia presentada a la mujer y a sus familiares, apoyar el estado fisiológico de la madre y del hijo.