



Nombre del alumno: Jorge Uziel del Ángel Vázquez.

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno Lopez

Cuatrimestre: 7'
Materia: Zootecnia de pequeñas especies.

Nombre del trabajo:
Actividad

Medicina veterinaria y zootecnia

Ocosingo, Chiapas a Octubre del 2023

RAZAS DE CONEJOS EN CHIAPAS



CONEJO TROPICAL (SYLVILAGUS BRASILIENSIS)

Este conejo que no está amenazado se distribuye desde el sur de Tamaulipas a lo largo de la costa del Océano Atlántico por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas hasta Brasil, donde se le da el nombre de **tapetí**.



DESCRIPCION

Lanza una longitud promedio del cuerpo con la cabeza de 32 cms, con una cola de 2,1 cm; patas traseras de 7,1 cm; orejas de 5,4 cm de diámetro. Pesa en promedio 634 gramos. El color de la espalda es marrón con aspecto moteado, resultante de las puntas de los pelos negros; presenta una mancha rufa en el cuello. Su vientre y la parte inferior de la cola también son de color rufa. La hembra tiene seis mamas.

ECOLOGIA

Este lagomorfo construye nidos sobre el suelo, compuestos de material seco arbustivo y comprendidos por una cámara central principal y de tres a cuatro cámaras adyacentes con un sistema de vías que conducen al exterior. El periodo reproductivo se extiende generalmente a través de todo el año.



GENERAL

Descripción.

El conejo brasileño o de bosque es un lagomorfo de pequeño a mediano tamaño, su cola es notablemente pequeña, al igual que sus patas y sus orejas. Tiene una coloración que varía de gris brillante a negro en la parte dorsal, desvaneciéndose hacia los lados del cuerpo. El vientre es blanquecino excepto por una pequeña mancha de color oscuro en la región de la garganta.

