Nombre de alumno: Jesus Esquivel Jimenez Saragos

Nombre del profesor: Mvz. Sandra Edith Moreno Lopez

Nombre del trabajo: Fases del Parto

Materia: Fisiología de la Reproducción Animal II

Grado: 4°

Grupo: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ocosingo, Chiapas 23 de Septiembre del 2023

FASES DEL PARTO EN CANINOS

Proximidad al parto

La perra puede mostrar cambios de comportamiento uno o dos días antes de la fecha de parto, pero estos cambios pueden ser más o menos evidentes, dependiendo de si la perra es primípara o multipara

- Uno de los primeros signos de la inminencia del parto es un descenso de la temperatura corporal de la madre de 38,5 °C a 37°C, aproximadamente de 12 a 24 horas antes del parto.
- La perra muestra intranquilidad y disminución del apetito entre 12-24 horas antes del parto

- El comportamiento de anidación y de escarbar en el suelo es variable y depende de factores individuales y ambientales

  - A medida que se acerca el parto, la perra pasa más tiempo en la zona elegida para parir

Parto

Consiste en la combinación de una serie de cambios fisiológicos, endocrinológicos y comportamentales que culminan con el nacimiento de los cachorros

El parto se desarrolla en tres fases

- La primera fase se producen las contracciones uterinas subclínicas, junto con la relajación vaginal y la dilatación del cérvix, pero todavía no se producen las contracciones abdominales
  - Puede prolongarse incluso hasta 36 horas en una hembra primeriza nerviosa
  - El cuello uterino y el útero se preparan para el parto con pequeñas contracciones que pueden pasar inadvertidas
  - La vulva empezará a hincharse preparándose para el parto.
- La segunda fase consiste en el trabajo de parto activo con el nacimiento de los cachorros
  - Se caracteriza por la presencia de contracciones abdominales fuertes y coordinadas, seguidas de la vocalización de la perra y la expulsión de líquidos fetales
  - Una vez que el cuello uterino se ha dilatado completamente, la presencia del primer cachorro en el cuello uterino provoca la aparición del reflejo de Ferguson que desencadena la liberación de oxitocina
    - Y por lo tanto
      - La contracción de músculos abdominales, dando lugar a la expulsión de los cachorros.

      - La madre debe romper la bolsa amniótica (si no se ha roto antes)

      - La perra también debe romper el cordón umbilical y lamer enérgicamente al neonato
      - Una secreción verdosa/marrón puede indicar que una placenta se ha separado. El cachorro debería nacer en las próximas 2-4 horas
- La tercera fase consiste en la expulsión de las membranas fetales

  - Las placentas deben salir tras el nacimiento de cada cachorro.
  - Algunas veces, durante el parto, las perras se comen las placentas para obtener energía y las vomitan después

    - Mas que nada se las comen para no llamar la atencion de otros animales y asi evita poner en riesgo su integridad de los cachorros

Comportamiento maternal durante el inicio del posparto

Una vez finalizado el parto, la perra debe presentar una serie de comportamientos que permitan la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los cachorros

Presented with xmind