



Mi Universidad

Cuadro Comparativo

Nombre del Alumno Angélica Montserrat Mendoza Santos

Nombre del tema Cuadro comparativo enfermedades hipertensivas en el embarazo

Parcial 4

Nombre de la Materia Ginecología y obstetricia


Nombre del profesor Dra. Katia Paola Martínez López

Nombre de la Licenciatura Medicina Humana

Cuatrimestre 7



- HIPERTENSION REACTIVA**
(Efecto de bata blanca)
-TA \geq 140/90 mmHg
-Ningún otro síntoma
- HIPERTENSION GESTACIONAL**
- TA \geq 140/90 mmHg
-Sin proteinuria
-Ningún otro síntoma
- PREECLAMPSIA SIN CRITERIOS DE SEVERIDAD**
-TA \geq 140/90 mmHg
-Puede o no existir proteinuria (>300 mg/24 hrs o 30 mg en muestras aisladas)
- PREECLAMPSIA CON CRITERIOS DE SEVERIDAD**
-TA \geq 160/110 mmHg
-Proteinuria >2 gr en orina 24 hrs
-Oliguria <500 ml en 24 hrs
-AST/ALT al doble o más
-Trombocitopenia <100 mil
-Cr >1.2 mg/dL
-Síntomas de vasoespasmo (Cefalea, acufenos, fosfenos etc.)
-Epigastralgia
-Edema pulmonar o cianosis
- SINDROME DE HELLP**
-15% debuta sin hipertensión
-AST/ALT >72 U/l
-DHL >600 IU/l
-Bilirrubina indirecta >1.2 mg/dL
-Trombocitopenia <100 mil
- HIPERTENSION CRONICA CON PREECLAMPSIA SOBREGREGADA**
-Proteinuria de novo o empeoramiento de proteinuria
-Difícil control de TA
- ECLAMPSIA**
-Preeclampsia + Convulsiones generalizadas de novo



- Hidralazina 25-50 mg VO c/6 hrs
- Labetalol 100-400 mg VO
- Alfametildopa 250-500 mg VO c/8 hrs
- Nifedipino 20-60 mg VO c/24 hrs

Esquema de Zuspan (4 gr de Sulfato de Mg IV p/30 mins. Seguir con infusión de 1gr x hora y mantener x 24 hrs

Px con gestación entre las 24-34 SDG se recomienda aplicaciones de inductores de madurez pulmonar

- Betametasona 12 mg c/24 hrs (2 dosis)
- Dexametasona 6 mg c/12 hrs (4 dosis)