



Mi Universidad

Cuadro comparativo.

Nombre del Alumno: **HERNÁNDEZ URBINA ANTONIO RAMÓN.**

Nombre del tema: **ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO.**

Parcial: **CUARTO.**

Nombre de la Materia: **CLINICA DE GINECOLOGÍA Y OBSTRETRICIA.**

Nombre del profesor: **DRA. MARTÍNEZ LÓPEZ KATIA PAOLA.**

Nombre de la Licenciatura: **MEDICINA HUMANA.**

Cuatrimestre: **SEPTIMO.**

ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS DEL EMBARAZO.

PATOLOGÍA:	ETIOLOGÍA:	CARACTERÍSTICAS:	SDG:	POSTPARTO:
HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO:	<ul style="list-style-type: none"> - Nulíparas. - Gestaciones múltiples. - Preeclamsia en embarazo anterior. 	Proteinuria negativa. Es diferente de la hipertensión crónica. La hipertensión crónica se presenta cuando una mujer tiene presión arterial alta antes de quedar embarazada.	A partir de las 20 SDG.	12 semanas.
PREECLAMPSIA:	<ul style="list-style-type: none"> - Enfermedad renal. - Diabetes. - Menor de 20 años o mayor de 40 años. - Multiparidad. 	Proteinuria mayor a 30 mg/24h, creatinina sérica elevada.	>20 SDG.	Hasta 2 semanas.
ECLAMPSIA:	Puede aparecer como resultado de la PA elevada y proteinuria presente.	Complicación de la preeclampsia severa, frecuentemente acompañado de síntomas neurológicos, que incluye: convulsiones, cefalea, fotopsia, ceguera cortical, vasoespasmo retinal, ECV, edema pulmonar, abrupto placentae.	Mayor o igual a las 20 SDG.	Hasta el decimo día.
HIPERTENSIÓN CRÓNICA:		Asociada o no a proteinuria, aumenta el riesgo de preeclampsia y de eclampsia, así como otras causas de morbimortalidad	Antes del embarazo o antes de la semana veinte de gestación.	Hasta la semana 6.

		materna, incluidos: encefalopatía hipertensiva, ACV, IR, SX. HELLP.		
HIPERTENSIÓN CRÓNICA MAS PREECLAMPSIA SOBRE AGRAGADA:		Hace referencia al desarrollo de preeclampsia o eclampsia en una mujer con hipertensión crónica preexistente.	Mayor o igual a las 20 SDG.	Hasta 2 semanas.
PREECLAMPSIA CON DATOS DE SEVERIDAD:		Puede cursar con cefalea, visión borrosa, dolor en flanco derecho, vomito, papilema, hipersensibilidad hepática, Sx. HELLP, trombocitopenia, etc.	Mayor o igual a las 20 SDG.	Hasta 2 semanas.