



CUADRO

Nombre de la Alumna: Ingrid Renata López Fino

Nombre del tema: Clasificación de la diarrea en función de su duración

Parcial: II

Nombre de la Materia: Medicina Interna

Nombre del profesor: Dra. Fabiola Arguello Melo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Cuatrimestre-Semestre

CLASIFICACIÓN DE LA DIARREA EN FUNCIÓN DE SU DURACIÓN, SEGÚN LA OMS Y LA WGO

	AGUDA	PERSISTENTE	CRÓNICA
¿Qué es?	Tres o más evacuaciones intestinales líquidas o semilíquidas en 24 horas o al menos una con presencia de elementos anormales (moco, sangre o pus).	Si su inicio es agudo, pero se mantiene de 2 a 4 semanas, se denomina diarrea persistente.	Diarrea crónica es aquella que ocurre por un período mayor de 4 semanas, y es un problema común que afecta hasta 5% de la población adulta.
Tipos	Infecciosa No infecciosa	Infecciosa No infecciosa	Infecciosa No infecciosa
Duración	Inferior a 14 días	De 2 a 4 semanas	Más de 4 semanas

Referencias:

- Gaztelurrutia Lavesa, L., & Andraca Iturbe, L. (2016). Curso básico sobre Patologías digestivas. Tema 4. Diarrea. Farmacia profesional (Internet), 30(4), 31-37. <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-sobre-patologias-digestivas--X0213932416571356>