



Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: lesly vazquez Mazariegos

Nombre del tema: cuidados inmediatos y mediatos del recién nacido

Parcial: 4.to

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: 4.to cuatrimestre

Prezén
Nacido

Concepto
(0-28 días)

Se define como un ser vulnerable ante aspectos:
sociales
Maternos
Económicos

Fases de
Nacimiento de
un Prezén nacido

Prezén Nacido Pre-termino

Nacido antes de las 37 semanas de gestación

Prezén Nacido a término

Nacido después de las 37 semanas y antes de las 42 semanas

Prezén Nacido Post-termino

Nacido después de las 42 semanas

Cuidados inmediatos en el Prezén Nacido

Son fundamentales para su adaptación óptima a la vida extrauterina. Deben ser planeadas y oportunas.

Maniobras en los primeros 5 minutos de vida

- Evitar pérdida de calor (retirar paños)
- Observar la posición que adopta
- Aspirar secreciones
- Llevar a cabo la vía aérea permeable
- Calificación de Apgar al minuto
- Estabilizar y controlar la temperatura corporal
- Ligar el cordón umbilical
- Valoración de Silverman
- Administrar vitamina K
- Aplicar profilaxis oftálmica
- Corroborar datos de la madre con el A.N.
- Valoración de caputo
- Valorar cura térmica a su temperatura

Cuidados inmediatos en el Prezén Nacido

Están orientados a valorar de manera continuosa su comportamiento hemodinámico para actuar de manera oportuna

Maniobras después de los 5 minutos de vida

- Somatometría
- Glicemia capilar
- Vitalografía (medición de signos vitales)
- Eutermia estricta
- Cuidado gástrico (si es que se indica)
- Alimentación asistida
- Cuidados de los accesos venosos
- Baño después de los 6 minutos de vida (entre las 9 am y las 4 pm)
- Tamiz neonatal
- Inmunizaciones

Escala de Valoración Apgar

Evalúa

- Frecuencia cardíaca
- Esfuerzo respiratorio
- Tono muscular
- Respuesta a estímulos
- Color

Objetivo

Valora la adaptación de las funciones corporales de un P.N al medio extrauterino y la reanimación inmediata

Posición

- 0 a 3: difícil
- 4 a 6: difícil
- 7 a 10: adaptación favorable a la vida extrauterina

Guías de cuidados inmediatos del Recién Nacido

Escala de valoración de Silverman-Andersen

- Objetivo
- Aleno nasal
 - Quejido respiratorio
 - Tiro intercostal
 - Retracción esternal
 - Disociación intercostal

Función es valorar la gravedad de afecciones respiratorias, como el síndrome de distress respiratorio

puntuación La puntuación más baja tiene el mejor pronóstico que la puntuación elevada

Test De Capurro

Valora la edad gestacional

Mediante

- Forma del pezón
- Textura de la piel
- Forma de la oreja
- Tejido mamario
- Pliegues plantares

Edad gestacional

- Posmaduro: 41 semanas +
- A término: 37 a 40 semanas
- Prematura leve: 35 y 36 semanas
- Prematura moderada: 32 y 34 semanas
- Prematura extrema: < 32 semanas

Fórmula

E = 204 + P
 P = puntuación obtenida
 C = edad gestacional

Somatometría Del Recién Nacido

- Edad gestacional: 0 a 30 días
- Peso: 2500 kg a 3500 kg
- Talla: 48-50 cm
- Perímetro cefálico: 33-35 cm
- Perímetro torácico: 33-34 cm
- Perímetro abdominal: 32 cm
- Segmento inferior: 19-22 cm
- Pie: 7-9 cm

Signos V. Faltes

- Frecuencia cardíaca: 140 a 150 lat/min
- Frecuencia respiratoria: 40-60 respiraciones/min
- Temperatura: 36.6 a 37.4 °C
- Presión arterial: 74 a 96 mm Hg

Ficha de Somatometría

- Recién nacido: Se pondrán los apellidos de la madre
- Hijo de la Dra: Nombre de la madre
- Talla: PT
- PC: PA
- Peso: Pie
- H/N: F/N
- Circulante: Nombre de la enfermera circulante

pulsera o brazalete

- Nombre y apellidos de la madre
- Fecha de nacimiento
- Hora de nacimiento
- Sexo del Recién Nacido

Antecedentes maternos

Diabetes mellitus gestacional

Se da cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina durante el embarazo

Anemia en el embarazo

Por deficiencia de hierro, ya que el cuerpo produce más sangre y necesita más hierro y nutrientes

Hipertensión en el embarazo

Puede provocar bajo peso al nacer o nacimiento prematuro, ocurre después de las 20 semanas.

Hipotirroidismo en el embarazo

Puede provocar aborto espontáneo, ocurre insuficiencia cardíaca, preeclampsia, anomalía de placenta y hemorragia en el parto

Antecedentes maternos

gestaciona} suficiente insulina durante el embarazo

Anemia en el embarazo} Por deficiencia de hierro, ya que el cuerpo produce más sangre y necesita más hierro y nutrientes

Hipertension en el embarazo} Puede provocar bajo peso al nacer o nacimiento prematuro, ocurre después de las 20 semanas.

Hipotiroidismo en el embarazo} Puede provocar aborto espontáneo, ocurre insuficiencia cardíaca, preeclampsia, anomalía de placenta y hemorragia en el posparto

Leche materna

Alimento que una madre puede ofrecer a su hijo para su desarrollo adecuado

Beneficios

- Nutrientes
- Digestión
- Absorción
- Tiene anticuerpos
- contra infecciones

Ventajas

- No requiere de industria
- No genera deechos o contaminación

Lactancia Materna} Establece vínculo madre-hijo

Tiempo horario} Se realiza en los primeros 30 mts de vida

Proceso} Dentro de los primeros 6 meses de vida

Importancia de la lactancia materna exclusiva

Lactancia materna exclusiva} Concepto} Significa dar solamente leche materna al bebé sin ningún otro líquido o agua

contiene calostro

Se le conoce como la primera vacuna limpia deposiciones y evita la ictericia

Para el niño o la niña

Para su desarrollo y crecimiento, protege de infecciones y enfermedades = gripa, asma, diarrea, desnutrición, sobrepeso o obesidad, diabetes.

Para la madre

Las mujeres pierden el peso ganado durante el embarazo y menos probable que padezca anemia después del parto menos riesgo de hipertensión, depresión posparto, cáncer de mama.

Para la familia

Contribuye en la economía del hogar para no comprar leche artificial, biberones, ellos se enferman menos, lo que disminuye en gastos de medicamentos.

Sabemos que un embarazo se da como producto de la concepción, es un proceso que puede durar de 37 a 42 semanas de gestación estando dentro de los parámetros normales, el producto de la concepción es un recién nacido denominado con algunos términos dependiendo de la semana en la que nazca, de ser así nacen con ciertas características, que pesen más o ya sea menos o que a cierto tiempo desarrollen algún tipo de patología o también sea durante el embarazo, el recién nacido está expuesto al ambiente en lo que le rodea, es importante fomentar la lactancia materna exclusiva ya que esta ayuda a que el bebé no contraiga enfermedades, ya que esta se conoce como su primera vacuna y lo protege de anticuerpos y ayuda al desarrollo y crecimiento del recién nacido, existen cuidados inmediatos y mediatos que el personal de enfermería debe desarrollar, los cuidados inmediatos se deben realizar en los primeros 5 minutos de vida del recién nacido y los cuidados mediatos después de los 5 minutos de vida, son realizados después de los cuidados inmediatos

BIBLIOGRAFÍA

Libro de Enfermería Pediátrica 2ª edición

Irma Valverde Molina

Nancy Angélica Mendoza Caballero

Isabel cristina peralta

Editorial: manual moderno

Cuidados inmediatos del Recién Nacido

- Evitar la pérdida de calor (retirar paño húmedo)
- Posicionamiento
- Aspiración de secreciones
- Vía aérea permeable
- Estabilización y control de la temperatura corporal
- Calificación de Apgar, silverman-Andersen y test de cupurro
- Ligadura del cordón umbilical
- Nueva valoración a los cinco minutos con Apgar
- Valoración de la permeabilidad esofágica
- Aplicación de vitamina K
- Profilaxis oftálmica
- Peso y Talla
- Valoración física completa
- Valoración de la permeabilidad anal
- Hallazgos, complicaciones o ambos
- Anotaciones correspondientes en los registros de enfermería.
- Identificación (Nombre de la madre, registro, fecha y hora de nacimiento, sexo, y número de cama)

Cuidados mediatos del Recién Nacido

- Identificar al recién nacido y registrar hallazgos, complicación y tratamientos
- Somnometría
- Glucemia capilar
- Vitolografía
- Eutermia estricta



- Lavado gástrico, previa valoración e indicación médica.
- Alimentación asistida
- Cuidados a los accesos venosos
- Tratamiento farmacológico prescrito
- Baño después de las 8 hrs de vida
- Tamiz neonatal
- Inmunizaciones

