

del Alumno: Darío Antonio Hernández Meza

Nombre del tema: Cuidados mediatos e inmediatos del recién nacido

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Cuidados de la mujer

Nombre del profesor: María Del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

DEFINICION

Conjunto de intervenciones invasivas o no invasivas que se le brinda al neonato durante el proceso de nacimiento

> Aspiración de secreciones debe ser suave, con presión negativa y poco vigorosa ya que se pueden provocar bradicardias situaciones O periodos de apnea

(por reacción vagal) o dañar la mucosa orofaríngea. Se empieza aspirar orofaringe después as fosas nasales. sin embargo, existen ocasiones que se requiere I.

ayuda de una sonda de aspiración ya que los bebés

que nacen por **CUIDADOS INMEDIATOS**

cesárea tienen más líquido en estómago o vía respiratoria).

- . Secado (debe ser vigoroso, por contacto y exhaustivo tratando de eliminar la mayor cantidad de líquido amniótico ya que este se evapora y provoca enfriamientos; secado debe empezar por la cabeza
- . Valoración APGAR al 1y 5 minutos (ayuda valorar la condición del niño posterior D nacimiento).
- . Valoración SILVERMAN-ANDERSON (ayuda a evaluar la dificultad respiratoria

-Ligadura del cordón umbilical (debe estar de 2a cm del borde abdominal; antes de realizar este procedimiento, algunas

instituciones toman una muestra sanguínea para determinar grupo factor RH: la ligadura debe realizarse con una pinza umbilical mayoría de los hospitales utilizan ligas de caucho). Hollister

Profilaxis ocular con antibiótico (cloranfenicol O nitrato de plata 1% 102 gotas cada ojo). vitamina KO fitomenadiona).

-Prevención de cuadros hemorrágicos (mediante la aplicación intramuscular de mg

Probar permeabilidad rectal (mediante un termómetro apropiado; ahf mismo puede valorarse a temperatura corporal). obstrucción).

cuando haya sospecha

- . Evaluar la permeabilidad esofágica (mediante una sonda orogástrica siempre L
- -Somatometría < antropometría (peso, talla, perímetro cefálico, torácico, abdominal, segmento súper inferior y pie).

. Valoración de CAPURRO (ayuda estimar la edad gestacional).

Signos vitales (FC, FR, TEMP SPO2y TA). madre

CUIDADOS MEDIATOS