



Mi Universidad

CUADRO SINÓPTICO

Nombre del Alumno: Hannya Eunice Domínguez Santiago

Nombre del tema: Cuidados inmediatos y mediatos del recién nacido

Parcial: IV

Nombre de la Materia: enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4° "B"

Comitán de Domínguez a 30 de noviembre 2023

CUIDADOS INMEDIATOS Y MEDIATOS DEL RECIÉN NACIDO

DEFINICIÓN

conjunto de intervenciones invasivas y no invasivas que se le brinda al neonato durante el proceso de nacimiento

OBJETIVO GENERAL

disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal mediante la exploración y valoración física de la persona recién nacida. Por lo tanto, una buena exploración física es elemental e indispensable para mantener la homeostasis de la persona recién nacida, por lo que esta debe ser completa y abarcar conocimientos (de anatomía), habilidades (en las diferentes técnicas o procedimientos) y actitudes (respeto por el trabajo)



¿CUÁLES SON ESOS CUIDADOS MEDIATOS E INMEDIATOS?

Los cuidados inmediatos son aquellas maniobras que se le realizan al producto en los primeros 5 minutos de vida extrauterina. Por otro lado, los cuidados mediatos son los procedimientos que se le realizan al bebé después de los 5 minutos de vida extrauterina

CUIDADOS INMEDIATOS



- Aspiración de secreciones (debe ser suave, con presión negativa y poco vigorosa ya que se pueden provocar bradicardias y situaciones o períodos de apnea (por reacción vagal) o dañar la mucosa orofaríngea. Se empieza a aspirar la orofaringe y después las fosas nasales, sin embargo, existen ocasiones que se requiere la ayuda de una sonda de aspiración ya que los bebés que nacen por cesárea tienen más líquido en estómago o vía respiratoria).
- Secado (debe ser vigoroso, por contacto y exhaustivo tratando de eliminar la mayor cantidad de líquido amniótico ya que este se evapora y provoca enfriamientos; el secado debe empezar por cabeza ya que es la zona por donde el bebé pierde más calor).
- Pinzado de cordón umbilical (generalmente se realiza con pinzas de hemostasia).
- Valoración APGAR al 1 y 5 minutos (ayuda a valorar la condición del niño posterior al nacimiento).
- Valoración SILVERMAN-ANDERSON (ayuda a evaluar la dificultad respiratoria).

CUIDADOS MEDIATOS

- Ligadura del cordón umbilical (debe estar de 2 a 5 cm del borde abdominal; antes de realizar este procedimiento, algunas instituciones toman una muestra sanguínea para determinar grupo y factor RH; la ligadura debe realizarse con una pinza umbilical Hollister, sin embargo, a mayoría de los hospitales utilizan ligas de caucho).
- Profilaxis ocular con antibiótico (cloranfenicol o nitrato de plata al 1% 1 o 2 gotas en cada ojo).
- Prevención de cuadros hemorrágicos (mediante la aplicación intramuscular de 1 mg de vitamina k o fitomenadiona).
- Probar permeabilidad rectal (mediante un termómetro apropiado; ahí mismo puede valorarse la temperatura corporal).
- Evaluar la permeabilidad esofágica (mediante una sonda orogástrica siempre y cuando haya sospecha de obstrucción).
- Somatometría y antropometría (peso, talla, perímetro cefálico, torácico, abdominal, segmento superior e inferior y pie).
- Valoración de CAPURRO (ayuda a estimar la edad gestacional).
- Signos vitales (FC, FR, TEMP, SPO2 y TA).
- Identificación del bebé (colocación de 2 pulseras, una en la muñeca derecha y otra en tobillo izquierdo con los datos de la madre APELLIDOS DE LA MADRE, FECHA Y HORA DE NACIMIENTO, SEXO y algunas instituciones colocan APGAR y SILVERMAN; toda esta información debe ser corroborada con la madre).

MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO

- Misceláneos: cura radiante, campos o compresas estériles calentadas, ropa del bebé.
- Equipo de succión: perilla de goma, catéter de aspiración o sonda de alimentación orogástrica de diferentes calibres, tubos y toma de succión.
- Equipo de ventilación: bolsa de resurrección neonatal con válvula de escape, mascarillas de diferentes tamaños, toma de oxígeno con humidificador, puntas nasales o casco cefálico.
- Equipo de intubación: laringoscopio con hoja recta (valorando edad gestacional), cánula endotraqueal (valorando edad gestacional).
- Medicamentos: Solución fisiológica al 0.9% / glucosada al 5% o 10% de 250 ml, vitamina k 1 mg, cloranfenicol o nitrato de plata 1%, adrenalina 1 mg/ml.

Bibliografía

Santiago, A. (23 de abril de 2022). *studocu*. Obtenido de Guía cuidados inmediatos y mediatos de la persona recién nacida: <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-de-sotavento-ac/enfermeria-de-la-aduldez/guia-cuidados-inmediatos-y-mediatos-de-la-persona-recien-nacida/34162942>