

**Nombre de alumno: FATIMA LIZBETH
PONCE SOBERANO**

**Nombre del profesor: MARIA CECILIA
ZAMORANO RODRIGUEZ**

**Materia: PRACTICA CLÍNICA DE
ENFERMERIA**

Grado: 7MO CUATRIMESTRE

Grupo: A

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

LAS

Úlceras Por Presión Se consideran una entidad importante por su incidencia y alta Prevalencia así como por las repercusiones asociadas.

SON

Una complicación trágica, pero evitable de la inmovilidad, afecta la calidad de vida de los Pacientes llegando incluso a ocasionarles la muerte.

LAS

Zonas Susceptibles de desarrollar UPP SON:
 Decúbito supino: Occipital, coxis, omóplato, codos, talones, pies.
 Decúbito lateral: Acromioclavicular, Trocánter, tobillos, maléolos, pies.
 Decúbito Prono: Frente, Ombros, Pechas, crestas Iliacas, Pubis.
 Sedación: occipital, escápulas

¿A qué debe Prestar Atención?

A

Piel agrietada, Úlcera abierta, Manchas de color amarillento, Puntos de Presión dolorosos y sensibles, Puntos de Presión rojos en la Piel.

¿Qué Puede hacer el Paciente?

NO

Moverse tanto, Cambiar de Posición cada 2 horas, Usar cojines especiales, no Usar Prendas Ceñidas, etc.

¿Qué Puede hacer el cuidador del Px?

Primero

Animar al Px Cambiarlo de Posición, Verificar si hay una Úlcera abierta.

¿En que momento llamar al equipo de atención médica?

Comp

Cuando tenga una área de Presión, Piel agrietada, Úlcera que se agranda, Úlcera con secreción y con mal olor

¿Cuándo el Paciente no Puede levantarse de la cama?

Primero

Si se nota un área de Presión enrojecida.
 Revise su espalda y costados
 Mantener a un ángulo de 30°
 Mantener las Sábanas de abajo.

BIBLIOGRAFÍA

DE LA ANTOLOGIA