

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Alexander Frias Alvarado

Nombre del tema: RCP

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Practica Clínica

Nombre del profesor: Cesilia Zamorano

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Inicio de RCP



si

no


Ritmo es
desfibrilable



**FV/ TV SIN
PULSO**

AESP/ Asistolia

Descarga




2 min de RCP
Adrenalina (1 mg cada
tres a cinco min)

Ritmo desfibrilación

no

RCP BASICO 5 ciclos **30** compresiones
X ventilaciones
RCP AVANZADO compresiones continuas por
cada 2 min , ventilaciones
8-10 por min (paciente con vía ara asegurada)

descarga




2 Min d RCP

Ritmo desfibrilación

si

descarga



Administración d lidocaína 1mg/kg o
Amiadarona bolo inicial d 300 mg
Tratar causas irreversibles

adrenalina

2 Min d RCP

Ritmo
desfibrilación

no

2 Min d RCP

- si no existen signos d retorno d la circulación continuar la reanimación
- si no existe retorno d circulación
- Cuidados post paro
- considerar si apropiado seguir con la reanimación

**RECOMENDACIONES RCP Y SOPORTE
VITAL AHA. ERC. ILCOR**

