



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Alma Azucena Claudio González

Parcial: II

Nombre de la Materia: Práctica clínica de enfermería II

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7

PREVENCIÓN DE UPP

¿Qué es?

Lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por presión prolongada o fricción

se ↓ Clasifica

Estadio 1.

Enrojecimiento de la piel

Estadio 2. Dermis

dañada parcialmente

Estadio 3. Llega

hasta fascia profunda

Estadio 4. Necrosis;

músculo, articulaciones hueso.

se ↓ Diagnóstico

mediante

→ Escala de Braden

→ Escala de Emina

→ Escala de Norton

→ Escala de Norton

→ modificada

Tratamiento

→ Crema de barrera

→ Terapia de presión

→ negativa

→ Dieta alta en proteínas

→ Antibiótico

→ Debridamiento

Se debe

Prevenir

→ Cambio de posición cada 2 horas

→ Evitar humedad

→ Utiliza colchoncillo protector

→ Uso de aditamentos

→ Valorar la piel constantemente

los ↓ Cuidados de enfermería

→ Mantener la higiene del paciente

→ Cambio de posición cada 2 horas con uso de aditamentos

→ Mantener la piel humectada con cremas absorbentes

→ Evitar la humedad por fluidos corporales

Bibliografía

UDS. (2003). UDS. Recuperado el 14 de 10 de 2023 de,

<https://plataformameducativauds.com.mx/assets/docolibro/LEN98e3f4f074560eef2460d2cc7864a7>

- LC-LEN 2017-20 PRACTICA 20 CLINICA 20 DE 1-20 ENFERMERIA 1. 03180A1-2011. pdf