

# WDS

**MATERIA:** ENFERMERIA EN URGENCIAS Y DESASTRES

**TEMA:** HEMORRAGIA DIGESTIVA

**PROFESOR:** MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

**GRADO:** 7MO. CUATRIMESTRE

**GRUPO:** (A) ESCOLARIZADO

**ALUMNA:** BETHSAIDA VAZQUEZ HERNANDEZ.

## INTRODUCCIÓN

La hemorragia digestiva es una condición médica que involucra la pérdida de sangre en el tracto gastrointestinal. Esta afección puede ser una emergencia médica y requiere una atención inmediata. En este ensayo, exploraremos las causas, los síntomas y los tratamientos de la hemorragia digestiva, además, veremos algunos ejemplos que ayudarán a comprender mejor esta patología.

En la mayoría de los casos la hemorragia digestiva se presenta de manera aguda y con importantes repercusiones sistémicas como hematemesis, melenas, hematoquecia, rectorragia, es importante tomar en cuenta la edad del paciente, comorbilidades, volumen, evolución y origen de la hemorragia digestiva, para determinar medidas urgentes en la estabilización de los pacientes, así como los cuidados de enfermería que se van a proporcionar con el propósito de minimizar la hemorragia y mantener la estabilidad hemodinámica.

## **HEMORRAGIA DIGESTIVA**

### **Causas de la Hemorragia Digestiva:**

**Úlceras pépticas:** Las úlceras en el estómago o el intestino pueden erosionar los vasos sanguíneos y provocar hemorragias.

**Enfermedad divertículo:** Los divertículos son sacos pequeños que se forman en el revestimiento del colon, y si se inflaman o se rompen pueden causar sangrado.

**Varices esofágicas:** Las personas con cirrosis hepática pueden desarrollar varices en el esófago, que son venas dilatadas y propensas a sangrar.

### **Síntomas de la Hemorragia Digestiva:**

**Vómito con sangre:** Puede variar desde pequeñas manchas de sangre hasta grandes cantidades de sangrado rojo y fresco.

**Heces oscuras y alquitranadas:** La sangre digerida en el estómago y el intestino puede mezclarse con las heces, dándoles un aspecto oscuro y alquitranado.

**Debilidad y mareos:** La pérdida de sangre puede llevar a la anemia, lo que puede resultar en síntomas como debilidad y mareos.

### **Tratamiento de la Hemorragia Digestiva:**

**Endoscopia:** Se utiliza un endoscopio para visualizar y detener el sangrado al tiempo que se realizan procedimientos como la escleroterapia o la ligadura de varices.

**Cirugía:** En casos graves, la cirugía puede ser necesaria para detener la hemorragia y reparar los vasos sanguíneos dañados.

**Medicamentos:** Se pueden recetar medicamentos para reducir la producción de ácido estomacal y permitir que las úlceras cicatricen.

## **Factores de riesgo**

- .Edad avanzada
- .Comorbilidades crónicas
- .Antecedentes patológicos personales de hemorragia digestiva
- .Tabaquismo y alcohol
- .Fármacos: corticoides inhibidores de la receptación de serotonina; inhibidores de la aldosterona, anticoagulantes orales, antiinflamatorios no esteroides (AINES).

**Las escalas que valoran son:** Escala de BLATCHFORD Y ESCALA DE ROCKALL.

## **Ejemplos:**

Un ejemplo común de hemorragia digestiva es el sangrado causado por una úlcera péptica. Una persona puede experimentar dolor abdominal y vómito con sangre si esta úlcera se ha vuelto más profunda y ha dañado un vaso sanguíneo.

**Otro ejemplo** es el sangrado causado por varices esofágicas en un paciente con cirrosis hepática avanzada. Las personas con esta enfermedad hepática pueden desarrollar venas dilatadas en el esófago que pueden sangrar y causar vómito con sangre.

## **CONCLUSIÓN**

**En conclusión la hemorragia digestiva es una condición seria que requiere atención médica inmediata. Conocer las causas, síntomas y opciones de tratamiento es fundamental para enfrentar adecuadamente esta afección. Espero que este ensayo te haya proporcionado un mejor entendimiento sobre la hemorragia digestiva y sus implicaciones para poder enfrentarla en cualquier momento en que se vaya a presentar en algún dado caso.**

## **BIBLIOGRAFIA**

(científica, 2020)

científica, r. m. (2020). <https://revistahcam.iess.gob.ec>. *En vista de cuidados de enfermería en pacientes con hemorragia digestiva*.