



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Omar David Franco Navarro

Nombre del tema: NOM 031-SSA2-2014

Parcial: 1

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado del niño y adolescente

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7

NOM
031-SSA2-2014

Definiciones

Cogito A

A

Método de evaluación de E.G al nacimiento desde 20.1 a 42.4hs

Crecimiento

Proceso fisiológico por el cual se incrementa número y tamaño de células, en años se mide a través de indicadores, peso y talla

Estimulación Temprana

Acciones sistematizadas y secuenciadas, conforme al curso normal del desarrollo realizadas por la madre o especialistas orientadas a favorecer ambiente de experiencias significativas



NDM
031-SSA2-2014

Consulta en
niños y niñas
sanos

El lactante sano a partir del mes de edad debe recibir consulta mensual hasta cumplir 12 meses.

De 1-4 años consulta cada 3 meses

De 5-9 años una consulta por año

Explorar en presencia de madre, padre o tutor:

S.N. Fc, FR, Temp y TA - sismometría y hábitos externos.

Piel y mucosas
Temperatura, coloración, hidratación, turgencia, demolicia, tipo y dist.

Cabeza
PC en su circunferencia occipito-frontal

amplitud de fontanelas en meses de 18 meses, abombamiento o depresión exostosis o endostosis y simetría facial

Norma
031-SSA2
2014

EXPLORACIÓN

Oídos

En pabellones auriculares, tamaño, simetría, implantación y presencia de apéndices o fosetas preauriculares. Conducto auditivo permeable.

Nariz

Permeabilidad de fosa nasal, presencia o ausencia de secreciones, depresión o desviación del puente nasal coloración de mucosa y cornetes.

Boca


Hidratación de mucosas, tamaño y características de amígdalas, adenoides, integridad de labios y paladar, macroglosia, carillo y brida deharrio

Cuello

Movilidad, morfología, turgencias, tamaño de tiroides y consistencia de ganglios cervicales.

Tórax

Tamaño, simetría, areolas mamarias y su coloración presencia de telara, FR, movimientos de amplexión y amplexación, presencia de retracciones, auscultación pulmonar y cardíaca



NOM
031-SSA2
2014

Exploración
vertebral

Valoración
del estado
de nutrición

Acciones
preventivas

Observar integridad, descartar xifosis, escoliosis
o hiperlordosis, nervos pilosas o tumores

Somatometría, talla, peso, PC hasta los 2 años
Circunferencia de cintura

Alimentación correcta durante el embarazo y
lactancia

LMT durante los primeros 6 meses y continúa
hasta los dos años

Desparasitación intestinal, periódica 2 veces al
año, a partir de los dos años.



Vacunaciones
universales

NOM
031-SSA2
2014

- Sabin Poliomielitis
- 2 gotas (0.1ml)
- SR Sarampión y Rubéola
- 0.5 ml.

• BCG para Tuberculosis	0.1ml al nacer	
• Hepatitis B	1a Al nacer 2a 2 meses 3a 6 meses	
• Pentavalente	Difteria 1a 2 meses Tos ferina 2a 4 meses Tétanos, Polio 3a 6 meses H. I. B. 4a 18 meses	
• DTP	Difteria 1a 2 meses Tos ferina 2a 4 meses Tétanos 3a 6 meses	
• Rotavirus	Diarrea por Rotavirus	Primer 1.5 y 2ml 2 meses Segunda 1.5 y 2ml 4 meses Tercera 1.5 y 2ml 6 meses
• Neumocócica	Infecciones por Neumococo	Primer 0.5ml 2 Segunda 0.5ml 4 Tercera 0.5ml 12 meses
• Tríplice	Primera 6 meses Segunda 7 meses Readministración Anual hasta los 59 meses	0.25 ml
• SRP Sarampión Rubéola Parotiditis	1 año 6 años	> 0.5 ml



D M A

Prevención y control de enfermedades diarréicas NOM 031-SSA2 2014

Medidas de prevención

Más importantes

- Saneamiento ambiental
- Educación para la salud de la población

Tipos

- Los que interrumpen mecanismos de transmisión
- Los que incrementan la resistencia del huésped a la infección

Reducción de incidencia de diarreas.

- Lactancia materna en madres de 6 m.
- Uso de agua potable
- Lavado de manos, manejo correcto de heces en niños con diarrea.
- Vacuna contra el sarampión

Tareas preventivas

- Cloración de agua y desinfección
- LME
- Ablactación 4-6 meses

Monitoreos clínicos de deshidratación

- Inguete
- Irritable
- Ojos hundidos
- Boca y lengua seca
- Sed
- Llenado capilar de 3-5 s.
- Frotamiento anterior hundido
- X Llagas/escoria
- Pulso débil

NOM
031-SSA2 -
2014

Manejo de
enfermedades
diarréicas

Plan A (Sin deshidratación)

- Continuar la alimentación habitual
- Aumentar ingesta de líquidos, NSD en < 1 año 150 ml en cuberitos o sorbos pequeños post evacuación
- Capacitar a la madre a reconocer signos de alarma

Plan B (con diarrea y deshidratación)

- NSD 100 ml/kg peso cada 30 minutos durante 4h
- Si presenta vómito esperar 10 min y empezar otra vez
- Si los vómitos persisten o gasto fecal 10g/kg/hora hidratar con SNG 20-30 ml.

Plan C (con choque hipovolémico por deshidratación)

- Inicio inmediato de líquidos I.V Hartmann o fisiol isotónica
- 1ra hora 30ml/kg
- 2da hora 25 ml/kg
- 3ra hora 25 ml/kg.

BIBLIOGRAFÍA

Enfermería en el cuidado del niño y el adolescente. (2023). Plataforma UDS. Recuperado 18 de septiembre de 2023, de <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/2cf0e97f5ddbc3db3b191822ce3a843a-LC-LEN703%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20CUIDADO%20DEL%20NI%20C3%91O%20Y%20EL%20ADOLESCENTE.pdf>