



Nombre del alumno: Diana Paola Sánchez García

Nombre del profesor: Maria Del Carmen López Silva

Nombre del trabajo: Cartel



Materia: Enfermería en el cuidado del niño y el adolescente

Grado y grupo: 7-A

Comitan De Dominguez Chiapas a 9 de noviembre de 2023.

VIH/SIDA:



Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema inmunitario y se encuentra en riesgo contraer


infecciones y cánceres mortales; cuando esto ocurre se le conoce como SIDA.

Síntomas: Fiebre y dolor muscular, cefalea, dolor de garganta, úlceras bucales, ganglios inflamados de axila, etc.

Tx: Tratamiento antirretroviral (TAR).



VPH:



El virus del papiloma humano son un grupo de virus relacionados entre sí que se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada o contacto de piel con piel.

Existen 2 categorías de VPH; el de bajo riesgo que causa verrugas alrededor de los genitales, la boca, ano o garganta. Y el de riesgo alto que puede causar varios tipos de cáncer:

- Cáncer de cuello uterino.
- Cáncer de ano.
- Cánceres de boca y garganta.
- Cáncer de vulva.

SIFILIS:



Es una ETS que se desarrolla en etapas y los síntomas pueden variar en cada una de ellas:

F. primaria: Se nota una o varias llagas en: pene, vagina, ano o boca que son redondas e indoloras que duran 3-6 semanas y luego desaparecen.

F. secundaria: Aparece sarpullido en la piel en una o más zonas del cuerpo; este no produce picazón, además de presentar llagas en la boca, vagina/pene y ano. Otros síntomas incluye: Fiebre, inflamación ganglios, dolor de garganta, caída cabello, cefalca, pérdida peso, dolores musculares y fatiga.

F. latente: Es un periodo en el que no hay signos ni síntomas visibles.

F. terciaria: En esta afecta muchos aparatos y sistemas del cuerpo; es la más grave y aparece entre 10-30 años después del comienzo de la enfermedad si esta no se trata.....

