



Nombre del alumno: José Fernando Aguilar
Gómez

Nombre del profesor: María Del Carmen
López Silba

Nombre del trabajo: Problemas Psicológicos
del adolescente

Materia: Enfermería en el cuidado del niño y
el adolescente

Grado: Séptimo cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de noviembre de 2023

BULIMIA

DEUDS



Transtorno alimenticio grave caracterizado por alteraciones seguidas de métodos para evitar el aumento de peso.

Diferencias
Anorexia
y
bulimia



La bulimia suele comenzar en la adolescencia y es más frecuente en niñas y adolescentes mujeres.

SINTOMAS DE UN TRASTORNO ALIMENTICIO


ANOREXIA	BULIMIA
1. Pérdida de peso	1. Pérdida de peso
2. Falta de interés por la comida	2. Episodios de atracones seguidos de purgas
3. Ausencia de hambre	3. Hinchazón abdominal
4. Preocupación por el peso	4. Preocupación por el peso



SINTOMAS

- Forzar el vomito tras un atracón
- Hacer ejercicio excesivo para no aumentar de peso.
- Ayunar
- Usar laxantes

GRAFICA



Trastorno alimenticio profesional y diagnóstico diferencial.