

**Nombre de alumno: FATIMA LIZBETH
PONCE SOBERANO**

**Nombre del profesor: MARIA DEL
CARMEN LÓPEZ SILBA**

**Materia: ENFERMERIA EN EL CUIDADO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE**

Grado: 7MO CUATRIMESTRE

Grupo: A

Vaginosis Bacteriana

El signo más común de una infección de Vaginosis bacteriana es un flujo líquido y blanquecino que suele describirse como con olor "a pescado". Sin embargo, algunas mujeres pueden no presentar ningún síntoma.

Es una infección vaginal común, Posiblemente de transmisión Sexual, que se Presenta en mujeres en edad reproductiva.

Ocurre cuando las bacterias Problemáticas que suelen estar presentes de manera normal en pequeñas cantidades crecen y reemplazan a los lactobacilos. la bacteria vaginal normal lo cual afecta el equilibrio habitual. Esta situación ocurre más a menudo si la mujer se hace duchas vaginales frecuentes o si tiene nuevas o múltiples Parejas Sexuales.



Hepatitis Viral

Es una enfermedad hepática grave que puede ser causada por diferentes virus, que pueden transmitirse por contacto sexual.

Hepatitis A: Causa una infección del Hígado de corto plazo o auto limitada que puede ser muy ya grave. La vacunación puede prevenir la infección.

Hepatitis B: Causa una enfermedad hepática grave que puede tener como consecuencia tanto una enfermedad inmediata como una infección para toda la vida.

Hepatitis C: Puede provocar una enfermedad inmediata que afecta el hígado, pero es más común que se transforme en una infección crónica y silenciosa que produce cirrosis, cáncer, insuficiencia hepática hasta la muerte.



Tricomoniasis

Es causada por el parásito protozoario unicelular, es común en las mujeres jóvenes sexualmente activas. El parásito también infecta a los hombres aunque con menor frecuencia. Puede transmitirse entre hombres y mujeres así como entre mujeres siempre que haya un contacto físico de las áreas genitales.

Aunque las infecciones no siempre causan síntomas, pueden causar picazón frecuente, dolorosa o con ardor en hombres y mujeres, así como flujo vaginal, ardor en micción o picazón genital en las mujeres. Dado que la infección puede ocurrir sin síntomas, una persona puede no saber que está infectada y seguir reinfectando a una pareja sexual que tiene signos recurrentes de infección.

