RCP AVANZADO

¿QUÉ ES?

Son todas las medidas que se aplican para el tratamiento definitivo de la parada, agrupadas en tres apartados fundamentales que son: vía aérea y ventilación; accesos vasculares, fármacos y líquidos; diagnóstico y tra- tamiento de las arritmias.

RCP.

- NO GRAPH Según la evidencia más reciente, no se recomienda el uso rutinario de la desfibrilación secuencial doble.
- NO GRAPH El acceso intravenoso (IV) es la vía preferida para la administración del medicamento durante la reanimación avanzada. El acceso intraóseo (IO) es aceptable si el acceso IV no está disponible.
- NO GRAPH La atención del paciente después del retorno de la circulación espontánea (RCE).
- Requiere especial atención a la oxigenación, control de la presión arterial, evaluación de
- La intervención coronaria percutánea, manejo específico de la temperatura y neuro pronóstico multimodal.

- Debido a que la recuperación de un paro cardíaco continúa mucho después de la hospitalización inicial, los pacientes deben contar con una evaluación y un apoyo formales para abordar sus necesidades físicas, cognitivas y psicosociales.
- Después de una reanimación, una retroalimentación (debriefing) es beneficioso para la salud mental y el bienestar de los reanimadores legos, los proveedores de SEM y los trabajadores de la salud hospitalarios.
- El abordaje de un paro cardíaco en el embarazo se centra en la reanimación de la madre, con la preparación para una cesárea perimortem, si es necesario, para salvar al hijo y mejorar las posibilidades de una reanimación exitosa de la madre.