



Nombre de alumno: Erivian Usbaldo Felipe Vazquez.

Nombre del profesor: María Cecilia Samorano Rodríguez.

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Práctica Clínica de Enfermería II.

Grado: 7 cuatrimestre.

Grupo: B

Valoración

de paciente deshidratado.

para entender los síntomas y signos que van a aparecer en el contexto

DEBEMOS CONOCER

- * La composición corporal del agua
- * Electrolitos
- * Regulación de la osmolaridad

"FISIOPATOLOGIA"

COMPOSICION CORPORAL DEL AGUA.

el agua es el componente más abundante del cuerpo humano.

- Porcentaje
- * 80% en R/P
 - * 50-60% en adultos

OSMOLARIDAD.

se define como el número de solutos que existe en una solución por cada kg de agua.

SEGUN SU VOLUMEN

- * LEUC
- * moderado
- * grave

"CLASIFICACION"

SEGUN SU NITREMIA.

- * Hiponatremia.
- * Isonatremia.
- * Hipernatremia.


PX

DHT

Valoración

de paciente deshidratado.

D	M	A



La deshidratación es un cuadro clínico originado por la excesiva pérdida de agua.

La principal causa de deshidratación está relacionada con la gastroenteritis aguda.

GASTROINTESTINAL

- * Diarrea
- * vómito
- * Ingesta de laxantes
- * síndromes.

ETIOLOGIA.

RENAL.

- * Poliuria.
- * Diuresis.
- * Nefropatías.

CUTANEO.

- * Hemorragias.
- * Fiebre
- * Ejercicio físico intenso.
- * calor intenso
- * Fototerapia.

ENDOCRINOLÓGICOS.

- * Diabetes
- * síndrome adrenogenital.

PX
DHT

Valoración de paciente deshidratado.

PX
DHT

SINTOMAS.

Deshidratación Leve.

- * Apariencia normal.
- * Alerta
- * Diuresis normal
- * color normal

Deshidratación CLINICA.

- * Apariencia alterada.
- * Disminución de la diuresis
- * color normal de piel
- * letárgico.

SHOCK CLINICO.

- * Alteración en el nivel de conciencia.

SIGNOS.

Deshidratación Leve.

- * Hojas no chistosas.
- * mucosas húmedas.
- * FC normal.
- * Patrón respiratorio normal
- * Mesado capilar ≤ 2 .

Deshidratación CLINICA.

- * ojos hundidos.
- * mucosas secas.
- * Taquicardia
- * Taquipnea.
- * Pérdida de turgencia.

SHOCK CLINICO.

- * Alteración progresiva de la conciencia.
- * palido o piel moteada
- * Extremidades frías.
- * Taquicardia, Taquipnea
- * Hipotensión (shock).

Valoración

de paciente deshidratado

no hay suficientes signos para clasificar como alguna deshidratación grave.

SIN DESHIDRATACION.

PLAN A.

Realizar:

Administración mayor cantidad de líquidos de lo habitual, mediante cucharadas o sopes.

Dosis:

* Menores de 12 meses 50-100ml
después de cada evacuación
* Mayores de 1 año 100-200ml después de cada evacuación

PX
DHT

Signos:

* ojos hundidos
* sediento
* al beber se ve la piel roja y se va lentamente.

PLAN B.

DESHIDRATACION MODERADA

Realizar:

* con administración de líquidos de lo habitual.
* tomar una vez cada hora

Dosis:

Tomar 50-100ml x kg.

PLAN C.

DESHIDRATACION GRAVE.

* Hospitalización y vigilancia
* CUC
* si mejora iniciar terapia oral.

Bibliografía

Sureste., U. U. (20 de 09 de 2023). *UDS Antologia de Practica Clinica de Enfermeria II*. Obtenido de file:///C:/Users/Erivian%20Usbaldo/Desktop/PRACTICA%20CLINICA%20DE%20ENFERMERIA%20II/PR%C3%81CTICA%20CLINICA%20DE%20ENFERMERIA%20II.pdf.