



Nombre de alumno: Erivian Usbaldo Felipe Vazquez.

Nombre del profesor: María Cecilia Samorano Rodríguez.

Nombre del trabajo: Super Nota

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Práctica Clínica de Enfermería II.

Grado: 7 cuatrimestre.

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 02 de diciembre

REANIMACION CARDIOPULMONAR

ritmos desfibrilables

- FV= fibrilación ventricular.
- TV= taquicardia ventricular sin pulso.



Medicamentos que se utiliza.

- adrenalina 1mg cada 3-5 min
- amiodarona bolo inicial de 300 mg



RCP avanzado.

- compresiones continuas por 2 minutos.
- ventilaciones de 8-10 por minuto.
- (el paciente debe de tener una vía aérea asegurada).



ritmos no desfibrilables.

- asistolia.
- AESP= actividad eléctrica sin pulso.



medicamentos que se utiliza.

- adrenalina 1mg cada 3-5 min



RCP básico.

- se debe de realizar
- 5 ciclos con 30 compresiones por dos ventilaciones.



¿SABÍAS QUE...?

- El paro cardíaco es la principal causa de muerte en adultos.
- La mayoría de los paros cardíacos sobreviven en personas con "enfermedades cardíacas"
- La probabilidad de sobrevivir a un paro cardíaco se duplica con el uso de RCP.
- El 75% de los paros cardíacos ocurren en casa.
- La víctima típica de un paro cardíaco es, en el caso de los hombres, aquellos que acaban de cumplirlos 60 años y, en el caso de las mujeres, a punto de cumplir los 70 años.
- Los hombres tienen el doble de posibilidades de sufrir un paro cardíaco que las mujeres.



Bibliografía

Sureste., U. U. (20 de 09 de 2023). *UDS Antología de Practica Clinica de Enfermeria II*. Obtenido de file:///C:/Users/Erivian%20Usbaldo/Desktop/PRACTICA%20CLINICA%20DE%20ENFERMERIA%20II/PR%C3%81CTICA%20CLINICA%20DE%20ENFERMERIA%20II.pdf.