

Tarea: errores del equipo #1

- Falta de coordinación
- No se menciono los puntos de la preparación, y se pasaron a la pre-oxigenación
- No se llevar el tiempo de la oxigenación con la mascarilla
- No hubo circuito cerrado
- No hubo una buena dirección y liderazgo
- No sabían porque via se aplicaba la lidocaina
- Falto material para su representación
- No se mencionaron los cuidados post-intubación
- La doctora debía dar la ventilación no la enfermera
- Reiniciaron la práctica
- No se llevo el tiempo del medicamento

Equipo #3

- No hay buena vociferación
- Falta de coordinación
- No mencionaron peso y edad del paciente
- No llevo el tiempo de oxigenación
- No se colocó guantes (Lider)
- No se menciona número de ~~onda~~ ^{manga} ni hay en
- No se menciona la conexión al monitor
- No aguraron vía peritórax

Equipo #4

- No aplico medicamento
- No busco vía peritórax
- El spray se colocaba dentro de la bolsa
- No hay coordinación

PRÁCTICA CLÍNICA II

- No menciona la saturación para intubar
- No había buena ventilación

- No pidió Rx

Celina Guadalupe Aguilar Zamorano 06/11/2023

SCQ = 10% en la parte antero posterior de la zona del pañal y el 1% en el dedo meñique

- Aplicación de ungüento (óxido de zinc)
- Colocación de apósitos limpios (con furasín)
- Cambio de apósitos y gases húmedas
- Aislar la herida de la humedad
- Promover la cicatrización de la herida con medicamentos
- Administración de analgésicos
- Aplicación de antibióticos

Celina Guadalupe Aguilar Zamorano 06/11/2023

SCQ = 17.2%


- 3% Los dedos (falanges) de la mano derecha Quemadura Grado 3
- 3% Los dedos de la mano izquierda Grado 3
- 9% Quemadura en cabeza y cara Grado 2
- 2.25% Pie izquierdo

*Se le aplica aislamiento de contacto

*Precauciones estándar: guantes, cubrebocas, bata, lavado de manos, gorro, lentes

CUIDADOS:

- Aplicación de gases trassinados
- Cambio de apósitos y gases
- Aislamiento de la humedad
- Administración de analgésicos
- Administración de antibióticos
- Promover la cicatrización por medio de ungüentos
- Limpieza y curación de herida
- En caso de ser necesario, la debridación
- Mantener en una posición elevada al pie
- Amputación de miembros inferiores: preparación para proxi o pivótesis; vía periférica, vendaje de miembros inferiores, insulina, inserción de sonda y permanencia



*Intubación endotraqueal: tubo endotraqueal, lidocaína, monitor oxímetro, laringoscopia, cánula, estetoscopia, guantes, ^{bolsa auto inflable} AMBU, Midazolam, Vecuronio

$\begin{array}{r} 70 \\ 18 \\ \hline 18 \\ 4 \end{array}$
 $\begin{array}{r} 13 \\ 6 \\ 9 \\ \hline 43 \end{array}$
 $\begin{array}{r} 43 \\ 112 \\ \hline 49 \end{array}$
 cond. torácica
 mapula
 18

Caso clínico 3
Elaborado por mí

Paciente femenina pediátrica de 3 años, presenta dificultad respiratoria, quemadura de 3er grado, su mamá refiere caída accidental de agua hirviendo en la mayor parte del cuerpo

- 10% cabeza
- 20% Parte anterior posterior
- 9% En el miembro superior izquierdo
- 3% En el miembro superior derecho
- 7% En miembros inferiores

Si se quemó la cabeza no se aplica vendaje de Capelina

Paciente femenina pediátrica, sin antecedentes, presenta quemaduras de ^{con 18kg} 3er grado, su mamá refiere caída accidental de agua hirviendo en la mayor parte del cuerpo. Presenta dificultad respiratoria debido a la quemadura en la parte torácica, presenta llagas

- Escala de EVA
- Dehidratación
- Aplicación de ungüentos
- Aplicación de medicamentos - vía parenteral
- Preparar todo para qx, vendaje
- Aplicación de gases o aparatos con tuberías
- Análisis quel de este mes

[Signature]
 Beersolito

Valoración Enfermero

Adulto joven acude a urgencias por malestar general,

refiriendo cefalea intensa, con hipertensión de 160/100 mmHg y diáforesis intensa, con pupilas isocóricas - 0211
 normoflexivas, con presencia de inflamación y refiere dolor
 irritación y con presencia de secreciones, nariz roja - 0211
 labios, narinas permeables con la aparición de dures, mucosa
 oral hidratada, con lengua seborreica, campos pulmonares
 sin compromiso, con presencia de prurito generalizado y
 sarpullido, además de petequias y aparición de - 0211
 Signo de Heiman.

Refiere artralgia generalizada, a una hora de haber
 ingresado se manifiesta sangrado en encías, nariz y
 recto (mefena).

Dx NANDA:

- 00025 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos

D: Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido
 de un espacio a otro

RIC:

Resultado NOC

- 602 Hidratación
- 1922 Control de riesgo: hipertensión
- 1008 Estado nutricional: Ingestión alimentaria y de líquidos

Intervenciones NIC

Hidratación

- 4180 - Manejo de la hipovolemia
- 4130 - Monitorización de líquidos
- 1050 - Alimentación
- 5246 - Asesoramiento nutricional
- 460 - Manejo de la diarrea
- 540 - Manejo de la eliminación urinaria
- 1570 - Manejo del vómito

Signos vitales 0802

- 6680 - Monitorización de los signos vitales
- 3800 - Tratamiento de hipotermia
- 2300 - Administración de medicación
- 6482 - Manejo ambiental - confort
- 2380 - Manejo de la medicación
- 2080 - Manejo de líquidos / electrolitos
- 1400 - Manejo de dolor
- 3320 - Oxigenoterapia

Estado nutricional

- 5246 - Asesoramiento nutricional
- 1050 - Alimentación
- 1240 - Ayuda para ganar peso
- 1100 - Manejo de la nutrición
- 1260 - Manejo del peso
- 1160 - Monitorización de líquidos