Nombre del Alumno: Carlos Alberto Hernández Sánchez

Nombre del tema: reproducción en ovinos y caprinos

Parcial: 2°

Nombre de la Materia: zootecnia de ovinos y caprinos

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 7°

Comitán de Domínguez a 12-10-2023

jk

Manejo de la Reproducción en ovinos y caprinos.

Características reproductivas de hembra

Producción y liberación de gametos variables, proveer el sitio de fecundación, la ovulación ocurre hacia el final del éstro (24-36 horas)

- Se observan movimiento de cola, conducta homosexual, inquietud, búsqueda del macho, liquido en vulva.
- La duración de la gestación es de 145-
- Placentación cotiledonaria, e histológicamente

Manejo reproductivo

Evitar animales con enfermedades del tracto genital masculino que pueden causar problemas de fertilidad al hato

- El chivito elegido deberá ser observado al año de vida para verificar que mantengan características deseables

Manejo de hembras y sus crías

- Cruzar hembras primerizas a 16-20 kg aprox. 1,5 años de edad
- Se debe evitar el cruce en hembras primerizas en malas condiciones corporales.

Control de reproducción

La época del año o estacionalidad: su efecto es directo sobre características reproductivas de las ovejas a través del fotoperiodo

- Estrés: efecto negativo sobre el proceso reproductivo
- Influencias sociales o de relaciones dentro de una especie : efecto efecto macho o respuesta inductora
- Nutrición: afecta la taza de ovulación, numero de ovocitos liberados al momento de la ovulación

Inseminación artificial

Inseminación pericervical o exocervical

- La más economía, consiste en depositar el semen fresco, en el primer pliegue del cérvix mediante una pipeta

Intrauterina mediante laparoscopia

Se utiliza una pistola de inseminación exocervical modificad, se introduce el semen dentro del útero atravesando el cuello uterino mediante una sonda método complejo y costoso el tiempo promedio es de 2,6 minutos por oveja

Intrauterina vía tras-cervical

- Penetración de la cavidad peritoneal dos incisiones de 5 mm a cada lado de línea medio-ventral con un trocar y una cánula permite la entrada de laparascopio

Lactancia

Influye en el crecimiento y la salud de las crías, en la lactancia y la calidad y cantidad de los productos lácteos

- La lactancia suele durar entre 60 a 150 días
- La leche de cabra tiene un menor % de grasa y de proteína que a la de oveja
- En caprinos puede extenderse hasta 10 meses